


REVISTA NICARAGUENSE DE ENTOMOLOGIA

N° 27.

Marzo 1994.




PUBLICACION DEL MUSEO ENTOMOLOGICO
SERVICIO ENTOMOLOGICO AUTONOMO
LEON — NICARAGUA

REVISTA NICARAGUENSE DE ENTOMOLOGIA

Nº 27.

Marzo 1994.



PUBLICACION DEL MUSEO ENTOMOLOGICO
SERVICIO ENTOMOLOGICO AUTONOMO
LEON — NICARAGUA

El Servicio Entomológico Autónomo tiene por objetivo fomentar el estudio de la Entomología en Nicaragua.

El correo relacionado con la revista se puede dirigir al editor :
Revista Nicaragüense de Entomología, A.P. 527, León, Nicaragua.

Las opiniones emitidas en la Revista Nicaragüense de Entomología son propias de los autores. El editor no asume la responsabilidad del contenido de los artículos.

Los artículos de esta publicación están reportados en:
Páginas de Contenido del CATIE, Costa Rica.
Páginas de contenido del CIAT, Colombia.

Abstracted in :
Entomology Abstracts.
Life Sciences Collections.
Review of Medical and Veterinary Entomology.
Review of Agricultural Entomology.
Zoological Record.

ISSN 1021-0296

Dibujo de la portada : *Deliathis nivea* (Coleoptera: Cerambycidae) (Dibujo tomado de Biología Centrali-Americana).

CATALOGO DE LOS CERAMBYCIDAE (COLEOPTERA) DE NICARAGUA.

Por Jean-Michel MAES,*
Albert ALLEN,**
Miguel A. MONNE,***
& Frank T. HOVORE.****

RESUMEN

Este catálogo presenta las 440 especies de Coleoptera Cerambycidae (3 Parandrinae, 20 Prioninae, 152 Cerambycinae, 9 Lepturinae, 9 Disteniinae, 247 Lamiinae) reportados de Nicaragua, con sus datos biológicos. 27 representan reportes nuevos para Nicaragua.

ABSTRACT

This catalogue presents the 440 species of Coleoptera Cerambycidae (3 Parandrinae, 20 Prioninae, 152 Cerambycinae, 9 Lepturinae, 9 Disteniinae, 247 Lamiinae) presently known from Nicaragua, with biological informations. 27 are new reports for Nicaragua.

- * Museo Entomológico, S.E.A., A.P. 527, León, Nicaragua.
- ** 9235 Wenatchee Ct., Boise, Idaho 83709, USA.
- *** Museu Nacional, Quinta da Boa Vista, 20942 Rio de Janeiro, RJ, BRASIL.
- **** University of California, Los Angeles, Department of Biology, Los Angeles, California 90024, USA.

INTRODUCCION

Los Cerambycidae forman una familia de coleópteros que se caracterizan principalmente por sus antenas muy largas. Son insectos de tamaño muy variado, desde algunos milímetros hasta varios centímetros, con coloración café o negro pero a veces muy vistosa. Las larvas son barrenadores de tallos de arbustos o de troncos de árboles, vivos o secos.

Para cada especie indicamos el nombre científico, el autor y el año de descripción. Cuando el autor esta puesto entre paréntesis significa que la especie ya no está ubicada en el género en el cual fué descrita y entonces entre corchetes indicamos el género donde fué originalmente descrita. Se presenta la distribución geográfica, para Nicaragua se presenta los departamentos de donde fué citada o donde está conocida la especie. También reportamos con un asterisco el país de donde fue descrita la especie, en el caso de Nicaragua, citamos la localidad precisa. Reportamos las plantas hospederas de la especie, agrupadas por familias, cuando ponemos un ? es que no hemos podido ubicar la familia de la planta. Las plantas hospederas están reportadas en xilófago (larvas barrenadoras de troncos o tallos) y nectarívoro (adultos que comen néctar de las flores de estas plantas). Algunos hospederos son solo casuales, tal vez solo un insecto adulto colectado sobre esta planta, sin significado real. Presentamos también los enemigos naturales conocidos, por lo general los enemigos de los Cerambycidae son poco conocidos.

SUBFAMILIA PARANDRINAE.

Hesperandra glabra (DEGEER, 1774) [*Attelabus*, *Parandra*].

= *Parandra testacea* FABRICIUS 1794.

= *Parandra ferruginea* STURM 1826.

= *Parandra mandibularis* PERTY 1830.

= *Parandra maxillosa* LAPORTE 1840.

= *Parandra lineolata* GORY 1844.

= *Parandra barbata* THOMSON 1861.

= *Parandra colombica* THOMSON 1861.

= *Parandra grandis* THOMSON 1861.

= *Parandra occipitalis* THOMSON 1867.

= *Parandra obsolescens* CASEY 1912.

= *Parandra glaberrima* ZIKAN 1948.

= *Parandra lucida* ZIKAN 1948.

Distribución : Guadalupe, St. Vincent, México, Nicaragua (Bates, 1872; Bates, 1879; Blackwelder, 1946; Duffy, 1960) (Chontales, Matagalpa), Costa Rica, Panamá, Colombia, Venezuela, Trinidad, Guiana, Guiana francesa, Brasil, Ecuador, Paraguay, Argentina.

Xilófago : Apocynaceae : *Aspidospermum*.
Araucariaceae : *Araucaria*.
Lauraceae : *Phoebe*.
Mimosaceae : *Acacia*.

Parandra angulicollis BATES, 1879.

= *Parandra punctata* ; BATES 1872 nec WHITE (Nicaragua: Chontales: Santo Domingo).

Distribución : México, Belize, Guatemala, Nicaragua (Bates, 1872; Bates, 1879; Blackwelder, 1946) (Chontales: Santo Domingo: Syntypus), Costa Rica, Panamá.

Parandra colombica WHITE, 1853.

= *Parandra gyllenhalii* THOMSON 1867.

= *Parandra scaritoides* THOMSON 1861.

Distribución : Nicaragua (Bates, 1872; Bates, 1879; Blackwelder, 1946; Chemsak & Linsley, 1982) (Chontales), Colombia.

SUBFAMILIA PRIONINAE.

Callipogon barbatum (FABRICIUS, 1781) [*Prionus*].

= *Callipogon friedlaenderi* NONFRIED 1892.

= *Callipogon hauseri* NONFRIED 1892.

= *Callipogon barbatum ornatum* BATES 1879 (Nicaragua: Chontales: Santo Domingo: Syntypus).

Distribución : Guatemala, Nicaragua (Bates, 1872; Bates, 1879; Blackwelder, 1946; Duffy, 1960; Chemsak & Linsley, 1982; Maes, 1992) (Chontales, Zelaya).

Xilófago : Pinaceae : *Pinus*.

Callipogon cinnamomeum (LINNAEUS, 1758) [*Cerambyx*, *Orthomegas*].

= *Callipogon cinctum* VOET 1778.

= *Callipogon corticanum* WILLIAMS 1829.

= *Prionus corticinum* OLIVIER 1790.

= *Callipogon mucronatum* FABRICIUS 1775.

= *Callipogon spadiceum* DALMAN 1817.

Distribución : Granada, Nicaragua (Bates, 1884; Blackwelder, 1946; Duffy, 1960), Colombia, Trinidad, Venezuela, Guiana, Guiana francesa, Brasil.

Xilófago : Bignoniaceae : *Jacaranda*.

Fabaceae : *Peltogyne*.

Lauraceae : *Ocotea*.

Malpighiaceae : *Byrsonima*.

Melastomaceae : *Miconia*.

Mimosaceae : *Inga*.

Moraceae : *Hevea*.

Callipogon sp.

Distribución : Nicaragua (Maes & Téllez, 1988; Maes, 1992) (Matagalpa).
Xilófago : Meliaceae : *Swietenia*, *Guarea*.
Sterculiaceae : *Theobroma*.

Derancistus nigroaeneus (BATES, 1869) [*Holonotus*].

Distribución : Nicaragua (Bates, 1869; Bates, 1872; Bates, 1879;
Blackwelder, 1946; Chemsak & Linsley, 1982) (Syntypus;
Chontales).

Derobranchus longicornis (BATES, 1872) [*Braderochus*].

= *Derobranchus smithi* BATES 1892.

Distribución : Guatemala, Nicaragua (Bates, 1872; Bates, 1879;
Blackwelder, 1946) (Chontales: Santo Domingo: Syntypus), Costa
Rica, Panamá, Ecuador.

Derobranchus sulcicornis LECONTE, 1851 [*Braderochus*].

= *Braderochus inaequalis* BATES 1872.

= *Derobranchus granulatus* BATES 1884.

= *Derobranchus kuwertii* NONFRIED 1891.

Distribución : México, Guatemala, Honduras, Nicaragua (Blackwelder,
1946; Chemsak & Linsley, 1982; Maes & Téllez, 1988) (Jinotega,
Estelí, León, Chinandega, Managua).

Fitófago : Rubiaceae : *Coffea*.

Sapindaceae : *Melicocca*.

Derobranchus sp.

Distribución : Nicaragua (Nueva Segovia).

Xilófago : Rubiaceae : *Coffea*.

Insuetaspis paradoxa (BATES, 1869) [*Mallaspis*, *Pyrodes*].

Distribución : Nicaragua (Bates, 1869; Bates, 1872; Bates, 1879;
Blackwelder, 1946) (Chontales: Santo Domingo: Syntypus), Costa
Rica, Panamá.

Macrodonia batesi LAMEERE, 1912.

= *Macrodonia dejeani*; BATES 1879 nec GORY.

= *Macrodonia laevis* POUILLAUDE 1915.

Distribución : Nicaragua (Bates, 1879; Blackwelder, 1946; Chemsak &
Linsley, 1982) (Chontales), Panamá.

Macrodonia dejeani dejeani GORY, 1839.

Distribución : Nicaragua (Bates, 1874) (Chontales), Panamá, Colombia.

Mallodonopsis mexicana THOMSON, 1860.

= *Mallodonopsis serrata* THOMSON 1865.

Distribución : México, Guatemala, Nicaragua (Bates, 1872; Bates, 1879; Blackwelder, 1946) (Chontales), Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador.

Otheostethus melanurus BATES, 1872.

Distribución : Nicaragua (Bates, 1872; Bates, 1879; Blackwelder, 1946; Chemsak & Linsley, 1982) (Chontales: Santo Domingo: Syntypus), Costa Rica.

Praemallaspis rhombodera BATES, 1879) [*Mallaspis*, *Pyrodes*].

Distribución : Nicaragua (Blackwelder, 1946; Chemsak & Linsley, 1982), Panamá, Colombia.

Scatopyrodes beltii (BATES, 1869) [*Mallaspis*, *Pyrodes*].

= *Mallaspis salvini* var.; BATES 1869 (Nicaragua: Chontales: Santo Domingo).

Distribución : Nicaragua (Bates, 1869; Bates, 1872; Bates, 1879; Blackwelder, 1946; Chemsak & Linsley, 1982) (Chontales: Santo Domingo: Syntypus), Costa Rica, Panamá, Colombia.

Stenodontes dasytomus masticator (THOMSON, 1867).

= *Mallodon angustatus* THOMSON 1867.

= *Stenodontes guatemalensis* CASEY 1912.

Distribución : México, Belize, Guatemala, Nicaragua (Bates, 1879; Blackwelder, 1946; Duffy, 1960) (Chontales, León, Chinandega, Managua), Panamá, Colombia, Tobago, Venezuela.

Xilófago : Aceraceae : *Acer*.

Fagaceae : *Quercus*.

Juglandaceae : *Carya*.

Salicaceae : *Salix*.

Ulmaceae : *Celtis*.

Stenodontes molaris molaris (BATES, 1879) [*Mallodon*].

= *Stenodontes chevrolati* BATES 1884.

= *Stenodontes mexicanus* BATES 1884.

Distribución : México, Belize, Guatemala, Nicaragua (Bates, 1879; Blackwelder, 1946) (Chontales: Santo Domingo: Syntypus; León), Panamá, Colombia, Perú.

Stenodontes spinibarbis (LINNAEUS, 1758) [Mallodon].

- = *Stenodontes miles* VOET 1778.
- = *Stenodontes frangens* VOET 1778.
- = *Stenodontes maxilllosa* OLIVIER 1795.
- = *Stenodontes dentata* FABRICIUS 1801.
- = *Stenodontes similis* SCHONHERR 1817.
- = *Stenodontes gagatina* GERMAR 1824.
- = *Stenodontes germari* THOMSON 1867.
- = *Stenodontes bonariense* THOMSON 1867.
- = *Stenodontes orbignyi* THOMSON 1867.
- = *Stenodontes subcancellatus* THOMSON 1867.
- = *Stenodontes baroni* CASEY 1912.

Distribución : Dominica, St.Vincent, México, Nicaragua (Bates, 1872)
(Chontales; León), Guiana, Guiana francesa, Brasil, Argentina.

Xilófago : Apocynaceae : *Aspidosperma*.

Fabaceae : *Dalbergia*, *Robinia*, *Ormosia*.

Lauraceae : *Ocotea*.

Melastomaceae : *Miconia*.

Myrtaceae : *Eucalyptus*.

Rutaceae : *Citrus*.

Salicaceae : *Salix*, *Populus*.

? : *Alexa*, *Catostemma*.

Strongylaspis bullatus BATES, 1872.

Distribución : Nicaragua (Bates, 1872; Bates, 1879; Blackwelder, 1946;
Chemsak & Linsley, 1982) (Chontales: Santo Domingo:
Syntypus).

Strongylaspis corticarius ERICHSON, 1848.

= *Strongylaspis belti* BATES 1884 (Nicaragua: Chontales: Santo Domingo:
Syntypus).

= *Strongylaspis costifer* THOMSON 1877.

= *Strongylaspis lobulifera* BATES 1892.

= *Strongylaspis scobinata* THOMSON 1860.

Distribución : Cuba, I.Pinos, Jamaica, México, Belize, Guatemala,
Nicaragua (Bates, 1872; Bates, 1879; Bates, 1884; Blackwelder,
1946) (Chontales), Venezuela, Guiana.

Strongylaspis sp.

Distribución : Nicaragua (Maes, 1992) (Zelaya).

SUBFAMILIA CERAMBYCINAE.

Achryson surinamum (LINNAEUS, 1767) [*Cerambyx*].

= *Achryson longicollis* DEGEER 1775.

= *Achryson biangulum* VOET 1778.

= *Achryson simplex* VOET 1778.

= *Stenocorus circumflexus* FABRICIUS 1787.

= *Achryson pallens* FABRICIUS 1792.

= *Achryson surinamum chontalense* BATES 1872 (Nicaragua: Chontales: Santo Domingo: Syntypus).

Distribución : USA, Cuba, Jamaica, Hispaniola, Antigua, Guadalupe, Dominica, St. Vincent, Grenada, México, Guatemala, Nicaragua (Bates, 1872; Bates, 1879; Blackwelder, 1946; Duffy, 1960; Maes & Téllez, 1988) (Chontales, Boaco, León), Costa Rica, Venezuela, Guiana, Paraguay, Argentina.

Xilófago : Apocynaceae : *Aspidospermum*.

Caesalpinaceae : *Tamarindus*.

Fabaceae : *Brya*, *Robinia*.

Lauraceae : *Nectandra*.

Malvaceae : *Gossypium*.

Mimosaceae : *Acacia*, *Inga*, *Prosopis*.

Moraceae : *Chlorophora*, *Ficus*.

Ulmaceae : *Celtis*, *Ulmus*.

? : *Cercidium*, *Schnopsis*.

Acyphoderes abdominalis (OLIVIER, 1795).

= *Acyphoderes olivieri* BATES 1870.

Distribución : Nicaragua (Bates, 1885; Blackwelder, 1946; Chemsak & Linsley, 1982) (Chontales), Guiana, Guiana francesa, Brasil, Perú.

Acyphoderes suavis BATES, 1885.

Distribución : México*, Nicaragua (reporte nuevo) (León).

Alcyopsis chalcea BATES, 1874.

Distribución : Nicaragua (Bates, 1874; Bates, 1880; Blackwelder, 1946; Chemsak & Linsley, 1982) (Chontales: Santo Domingo: Syntypus).

Anatinomma brevicornis FISHER, 1944.

Distribución : Nicaragua (reporte nuevo), Costa Rica*.

Ancylocera cribricollis BATES, 1885.

Distribución : México*, Nicaragua (reporte nuevo) (Managua).

Fitófago : Malvaceae : *Gossypium*.

Ancylocera macrotela BATES, 1880.

= *Ancylocera rugicollis*; BATES 1872 nec FABRICIUS (Nicaragua:
Chontales: Santo Domingo).

Distribución : México, Guatemala, Nicaragua (Bates, 1872; Bates, 1880;
Blackwelder, 1946; Chemsak & Linsley, 1982) (Chontales: Santo
Domingo: Syntypus).

Ancylocera sp.

Distribución : Nicaragua (Maes & Téllez, 1988) (Managua).

Xilófago : Malvaceae : *Gossypium*.

Poaceae : *Zea*, *Sorghum*.

Anelaphus daedalus (BATES, 1874) [*Hypermallus*, *Elaphidion*].

Distribución : Nicaragua (Bates, 1874; Bates, 1880; Blackwelder, 1946;
Chemsak & Linsley, 1982) (Chontales: Santo Domingo:
Syntypus).

Anelaphus inermis NEWMAN, 1841 [*Hypermallus*, *Elaphidion*].

Distribución : USA, Guatemala, Nicaragua (Bates, 1885; Blackwelder,
1946; Duffy, 1960) (Chontales), Panamá.

Xilófago : Fagaceae : *Quercus*.

Rutaceae : *Citrus*.

Anelaphus jansonii LINSLEY, 1961.

Distribución : Nicaragua (Chemsak & Linsley, 1982), Costa Rica.

Anelaphus misellus (BATES, 1885) [*Hypermallus*].

Distribución : Guatemala*, Honduras, Nicaragua (reporte nuevo) (León).

Anthoboscus tricolor (CHEVROLAT, 1835) [*Clytus*, *Trichoxys*].

Distribución : México*, Guatemala, Nicaragua (reporte nuevo) (Matagalpa),
Costa Rica.

Asynapteron glabriolum (BATES, 1872) [*Octoplon*].

Distribución : México, Nicaragua (Bates, 1872; Bates, 1880; Blackwelder,
1946; Martins, 1970; Chemsak & Linsley, 1982) (Chontales: Santo
Domingo: Syntypus; Boaco), Costa Rica, Colombia, Ecuador.

Brasiliianus mexicanus (THOMSON, 1860) [*Hammaticherus*].

= *Hammaticherus castaneus* BATES 1870.

Distribución : México, Belize, Nicaragua (Bates, 1870; Bates, 1872; Bates,
1879; Bates, 1884; Blackwelder, 1946; Duffy, 1960; Maes &
Téllez, 1988) (Chontales, León, Masaya), Guiana, Brasil.

Xilófago : Anacardiaceae : *Astronium*, *Spondias*,
 Fabaceae : *Peltogyne*.
 Meliaceae : *Cedrella*.
 Sapotaceae : *Chrysophyllum*.
 Ulmaceae : *Trema*.
 ? : *Eulinura*.

Callichroma batesi GAHAN, 1894.

= *Callichroma cosmicum*; BATES 1872 nec WHITE.

Distribución : Honduras, Nicaragua (Bates, 1872; Bates, 1880;
 Gahan, 1894; Blackwelder, 1946; Chemsak & Linsley, 1982)
 (Chontales: Santo Domingo: Syntypus), Costa Rica.

Callichroma cosmica WHITE, 1853.

Distribución : Honduras, Nicaragua (Bates, 1872; Bates, 1880;
 Blackwelder, 1946; Chemsak & Linsley, 1982) (Chontales).

Callichroma minima PODANY, 1965.

Distribución : Nicaragua (Podany, 1965; Chemsak & Linsley, 1982)
 (Syntypus).

Callichroma sp.

Distribución : Nicaragua (Matagalpa).

Callona rutilans (BATES, 1869) [*Crioprosopus*].

Distribución : Nicaragua (Bates, 1869; Bates, 1872; Bates, 1880;
 Blackwelder, 1946; Chemsak & Linsley, 1982) (Chontales: Santo
 Domingo: Syntypus).

Chemsakia semicostatus (BATES, 1872) [*Pleuromenus*].

Distribución : Nicaragua (Bates, 1872; Bates, 1880; Blackwelder, 1946;
 Chemsak & Linsley, 1982) (Chontales: Santo Domingo: Syntypus).

Chlorida cincta GUERIN, 1844.

Distribución : México, Guatemala, Nicaragua (Bates, 1872; Bates, 1880;
 Blackwelder, 1946) (Chontales), Costa Rica, Panamá.

Chlorida festiva (LINNAEUS, 1758) [*Cerambyx*].

= *Chlorida africana* VOET 1778.

= *Chlorida spinosa* DEGEER 1775.

= *Cerambyx sulcata* SULZER 1776.

barrenador del mango.

Distribución : Africa, Cuba, I.Pinos, Jamaica, Hispaniola, Puerto Rico,
 Antigua, Is. Leeward, Guadalupe, Dominica, Barbados, St.Vincent,
 Granada, Nicaragua (Bates, 1872; Bates, 1880; Blackwelder,
 1946; Duffy, 1960) (Chontales, Managua), Panamá, Trinidad,
 Guiana, Brasil, Argentina.

Xilófago : Anacardiaceae : *Astronium*, *Mangifera*.
 Casuarinaceae : *Casuarina*.
 Fabaceae : *Brya*.
 Meliaceae : *Swietenia*.
 Mimosaceae : *Acacia*, *Enterolobium*, *Albizzia*.
 Moraceae : *Hevea*.
 Myrtaceae : *Psidium*.
 Polygonaceae : *Triplaris*.
 Rubiaceae : *Coffea*.
 Solanaceae : *Solanum*.
 Sterculiaceae : *Theobroma*.
 ? : *Stahlia*, *Alchornea*, *Clathrotropis*.

Enemigos naturales :
 Aves : *Crotophaga ani*.
 ACA. Uropodidae.

Chrysoprasia belti BATES, 1872.

Distribución : Nicaragua (Bates, 1872; Bates, 1880; Blackwelder, 1946;
 Chemsak & Linsley, 1982) (Chontales: Santo Domingo: Syntypus),
 Costa Rica, Panamá.

Chrysoprasia hypocrita ERICHSON, 1847.

= *Chrysoprasia sthenias* BATES 1870 (parte).
 Distribución : México, Nicaragua (Bates, 1880; Blackwelder, 1946;
 Chemsak & Linsley, 1982) (Chontales), Brasil, Perú.

Chrysoprasia jacintha BATES, 1880.

= *Chrysoprasia hirtula*; BATES 1872 nec WHITE (Nicaragua: Chontales:
 Santo Domingo).
 Distribución : Nicaragua (Bates, 1872; Bates, 1880; Blackwelder, 1946;
 Chemsak & Linsley, 1982) (Chontales: Santo Domingo: Syntypus),
 Costa Rica.

Chrysoprasia seticornis BATES, 1880.

= *Chrysoprasia sobrina*; BATES 1872 nec BATES (Nicaragua: Chontales:
 Santo Domingo).
 Distribución : Nicaragua (Bates, 1872; Bates, 1880; Blackwelder, 1946;
 Chemsak & Linsley, 1982) (Chontales: Santo Domingo: Syntypus),
 Costa Rica.

Cleozona pulchra BATES, 1874.

Distribución : México, Nicaragua (Bates, 1874; Bates, 1880; Blackwelder,
 1946; Chemsak & Linsley, 1982; Maes & Téllez, 1988) (Chontales:
 Santo Domingo: Syntypus; Managua, León).
 Xilófago : Poaceae : *Zea*.

- Coleoxestia bimaculata* FUCHS, 1955.
Distribución : Nicaragua (Fuchs, 1955; Chemsak & Linsley, 1982)
(Managua: Managua: Syntypus), Costa Rica, Panamá.
- Coleoxestia nitida* (BATES, 1872) [*Xestia*].
Distribución : México, Nicaragua (Bates, 1872; Bates, 1880; Blackwelder, 1946; Chemsak & Linsley, 1982) (Chontales: Santo Domingo: Syntypus).
- Coleoxestia pilosovittata* BATES, 1872.
Distribución : Nicaragua (Bates, 1872; Bates, 1880; Chemsak & Linsley, 1982) (Chontales: Santo Domingo: Syntypus), Panamá.
- Coleoxestia sanguinipes* (BATES, 1884) [*Xestia*].
Distribución : Nicaragua (Bates, 1884; Blackwelder, 1946; Chemsak & Linsley, 1982) (Chontales: Javalí: Syntypus), Costa Rica, Panamá.
- Coremia plumipes* (PALLAS, 1772).
= *Saperda hirtipes* OLIVIER 1795 [*Coremia*].
Distribución : Nicaragua (Bates, 1872; Belt, 1874; Bates, 1880; Blackwelder, 1946; Chemsak & Linsley, 1982) (Chontales), Panamá, Guiana francesa, Brasil.
- Cosmisoma martyr* THOMSON, 1860.
= *Cosmisoma martyra* BATES 1872.
Distribución : Guatemala, Nicaragua (Bates, 1872; Bates, 1880; Blackwelder, 1946) (Chontales), Costa Rica*, Panamá.
- Cosmisoma titania* BATES, 1870.
Distribución : Nicaragua (Bates, 1870; Belt, 1872; Belt, 1874; Bates, 1880; Blackwelder, 1946; Chemsak & Linsley, 1982) (Chontales: Santo Domingo: Syntypus), Costa Rica.
- Cosmoplatidius sellatus* (WHITE, 1853) [*Pteroplatus*].
Distribución : México*, Honduras, Nicaragua (Bates, 1872; Bates, 1880; Blackwelder, 1946) (Chontales), Costa Rica, Panamá.
- Diasporidion duplicatum* (GOUNELLE, 1909).
= *Ibidion binoculatum* LINSLEY, 1935.
Distribución : México, El Salvador, Nicaragua (reporte nuevo) (Matagalpa), Costa Rica, Panamá, Colombia, Venezuela, Brasil.
- Dihammaphora chontalensis* BATES, 1872.
Distribución : Nicaragua (Bates, 1872; Bates, 1880; Blackwelder, 1946; Chemsak & Linsley, 1982) (Chontales: Santo Domingo: Syntypus), Costa Rica, Panamá.

Diphyrama singularis BATES, 1872.

Distribución : Nicaragua (Bates, 1872; Bates, 1880; Blackwelder, 1946; Chemsak & Linsley, 1982) (Chontales: Santo Domingo: Syntypus), Costa Rica, Panamá.

Eburia brevispinis BATES, 1880.

Distribución : México*, Nicaragua (reporte nuevo).

Eburia fulginea (BATES, 1872) [*Pantomallus*].

Distribución : México, Guatemala, Nicaragua (Bates, 1872; Bates, 1880; Blackwelder, 1946; Chemsak & Linsley, 1982) (Chontales: Santo Domingo: Syntypus), Panamá.

Eburia pedestris WHITE, 1853.

Distribución : Belize, Guatemala, Honduras*, Nicaragua (Bates, 1872; Bates, 1880; Blackwelder, 1946) (Chontales, Boaco), Panamá.

Eburia stigma (OLIVIER, 1795) [*Cerambyx*].

= *Eburia duvalii* CHEVROLAT 1862.

Distribución : USA, Bahamas, Cuba, Hispaniola, México, Nicaragua (Bates, 1872; Bates, 1880; Blackwelder, 1946) (Chontales).

Eburia sp.

Distribución : Nicaragua (Maes & Téllez, 1988) (Masaya).
Fitófago : Rubiaceae : *Coffea*.

Eburodacrys callixantha BATES, 1872.

Distribución : México, Nicaragua (Bates, 1872; Bates, 1880; Blackwelder, 1946) (Chontales: Santo Domingo: Syntypus), Panamá, Venezuela.

Eburodacrys coalescens BATES, 1884.

Distribución : Nicaragua (Bates, 1884; Blackwelder, 1946; Chemsak & Linsley, 1982) (Syntypus), Costa Rica, Panamá.

Eburodacrys havanensis CHEVROLAT, 1862.

Distribución : Cuba*, Nicaragua (Bates, 1872; Bates, 1880; Blackwelder, 1946) (Chontales), Costa Rica, Panamá, Venezuela.

Eburodacrys hesperidis CHEMSAK & LINSLEY, 1970.

Distribución : México, Nicaragua (reporte nuevo) (Managua).

Eburodacrys laevicornis BATES, 1884.

Distribución : Nicaragua (reporte nuevo), Panamá, Venezuela.

Eburodacrys sticticollis BATES, 1874.

Distribución : Nicaragua (Bates, 1874; Bates, 1880; Blackwelder, 1946; Chemsak & Linsley, 1982) (Chontales: Santo Domingo: Syntypus), Costa Rica.

Eburodacrys triocellata (STAL, 1857).

= *Eburodacrys mexicana* THOMSON 1860.

Distribución : México, Guatemala, Nicaragua (Maes & Téllez, 1988) (Managua), Panamá, Colombia, Venezuela.

Xilófago : Melliaceae : *Cedrella*.

Rutaceae : *Citrus*.

Eburodacrys sp.

Distribución : Nicaragua (León).

Ectenessa nitida BATES, 1885.

Distribución : México, Nicaragua (Bates, 1885; Blackwelder, 1946; Chemsak & Linsley, 1982; Napp & Martins, 1982) (Syntypus).

Elaphidion irroratum (LINNAEUS, 1767) [*Cerambyx*].

= *Elaphidion ordinatum* NEWMAN 1840.

= *Elaphidion tessellatum* NEWMAN 1840.

Distribución : USA, Cuba, I. Pinos, Jamaica, Hispaniola, I. Mona, Puerto Rico, Is. Leeward, Guadalupe, México, Nicaragua (Bates, 1872; Bates, 1880; Blackwelder, 1946; Duffy, 1960) (Chontales).

Xilófago : Combretaceae : *Laguncularia*.

Mimosaceae : *Albizzia*.

Verbenaceae : *Avicennia*.

Enemigos Naturales :

COL. Elateridae : *Chalcolepidius silbermanni*.

Elaphidion scabricolle (BATES, 1872) [*Hypermallus*].

Distribución : Nicaragua (Bates, 1872; Bates, 1880; Blackwelder, 1946; Chemsak & Linsley, 1982) (Chontales: Santo Domingo: Syntypus).

Elaphidion sp.

Distribución : Nicaragua (Masaya).

Enaphalodes coronatum (WHITE, 1853) [*Elaphidion*].

Distribución : México, Belize, Guatemala, Honduras*, Nicaragua (Bates, 1872; Bates, 1880; Blackwelder, 1946) (Chontales).

Eriphus prolixus BATES, 1872.

Distribución : Nicaragua (Bates, 1872; Bates, 1880; Blackwelder, 1946; Chemsak & Linsley, 1982) (Chontales: Santo Domingo: Syntypus).

- Euderces rubella* (BATES, 1885) [*Apilocera*, *Eplophorus*].
Distribución : Guatemala*, Nicaragua (reporte nuevo) (Nueva Segovia).
- Eutrichophoroides albisparsus* (BATES, 1872) [*Trichophorus*].
Distribución : México, Nicaragua (Bates, 1872; Bates, 1880; Blackwelder, 1946) (Chontales: Santo Domingo: Syntypus), Costa Rica.
- Eutrichophoroides jansonii* (BATES, 1885) [*Trichophorus*].
Distribución : México, Nicaragua (Bates, 1885; Blackwelder, 1946; Chemsak & Linsley, 1982) (Chontales: Santo Domingo: Syntypus), Costa Rica.
- Gnaphalodes trachyderoides* THOMSON, 1860.
Distribución : USA, México*, Belize, Nicaragua (Bates, 1872; Bates, 1880; Blackwelder, 1946; Maes & Téllez, 1988) (Chontales, Carazo, León), Costa Rica, Panamá.
Xilófago : Fabaceae : *Phaseolus*.
- Gorybia chontalensis* (BATES, 1880) (*Haruspex*).
Distribución : Nicaragua (Bates, 1880; Blackwelder, 1946; Chemsak & Linsley, 1982) (Chontales: Santo Domingo: Syntypus), Panamá.
- Heterachthes ebenus* NEWMAN, 1840 [*Ibidion*, *Compsa*].
= *Heterachthes exilissimus* CASEY 1912.
= *Heterachthes floridanus* CASEY 1912.
Distribución : USA, Bahamas, Puerto Rico, Cuba, México, Guatemala, Nicaragua (Bates, 1872; Bates, 1880; Blackwelder, 1946; Martins, 1970) (Chontales), Colombia, Venezuela, Guiana, Surinam, Brasil, Uruguay, Argentina.
Xilófago : Pinaceae : *Pinus*.
- Heterachthes nigrocinctus* BATES, 1872 [*Ibidion*].
Distribución : ?Belize, Nicaragua (Bates, 1872; Bates, 1880; Blackwelder, 1946; Martins, 1970; Chemsak & Linsley, 1982) (Chontales: Santo Domingo: Syntypus), Costa Rica, Panamá.
- Hexoplon albipenne* BATES, 1872.
Distribución : Guatemala, Nicaragua (Bates, 1872; Bates, 1880; Blackwelder, 1946) (Chontales: Santo Domingo: Syntypus), Costa Rica, Panamá.
- Ironeus duplex* BATES, 1872.
Distribución : México, Nicaragua (Bates, 1872; Bates, 1880; Blackwelder, 1946; Chemsak & Linsley, 1982) (Chontales: Santo Domingo: Syntypus; León), Costa Rica.

Ironeus pulcher BATES, 1880.

Distribución : México, Nicaragua (Bates, 1880; Blackwelder, 1946; Chemsak & Linsley, 1982) (Chontales: Santo Domingo: Syntypus), Costa Rica, Panamá.

Ischionodonta serripes (BATES, 1872) [*Rhopalophora*].

Distribución : Nicaragua (Bates, 1872; Bates, 1880; Blackwelder, 1946; Chemsak & Linsley, 1982) (Chontales: Santo Domingo: Syntypus), Costa Rica, Panamá.

Ischionodonta versicolor (CHEVROLAT, 1859) [*Rhopalophora*].

Distribución : Nicaragua (Bates, 1872; Bates, 1880; Blackwelder, 1946; Chemsak & Linsley, 1982) (Chontales), Costa Rica, Panamá, Colombia*.

Lissonotus flavocinctus multifasciatus DUPONT, 1838.

Distribución : México*, Guatemala, El Salvador, Nicaragua (Bates, 1872; Bates, 1880; Blackwelder, 1946; Maes & Téllez, 1988) (Chontales, Managua, León), Panamá.

Xilófago : Fabaceae : *Phaseolus*.

Poaceae : *Sorghum*.

Rubiaceae : *Coffea*.

Sterculiaceae : *Guazuma*.

Listroptera aterrima GERMAR, 1824.

Distribución : México, Guatemala, Nicaragua (Bates, 1872; Bates, 1880; Blackwelder, 1946) (Chontales), Costa Rica, Panamá, Brasil, Perú, Argentina.

Malacopterus tenellus FABRICIUS, 1801.

= *Malacopterus lineatus* GUERIN 1844.

= *Malacopterus mexicanus* THOMSON 1860.

= *Malacopterus vittatus* LECONTE 1873.

Distribución : USA, México, Belize, Guatemala, Nicaragua (Bates, 1872; Bates, 1879; Blackwelder, 1946) (Chontales, Managua), Panamá, Colombia, Venezuela, Brasil.

Mallocera spinicollis BATES, 1872.

Distribución : Nicaragua (Bates, 1872; Bates, 1880; Chemsak & Linsley, 1982) (Chontales: Santo Domingo: Syntypus).

Mecometopus aesopus (CHEVROLAT, 1860) [*Tillomorpha*, *Clytus*, *Neoclytus*].

Distribución : México*, Nicaragua (Bates, 1872; Bates, 1880; Blackwelder, 1946; Chemsak & Linsley, 1982) (Chontales).

Mecometopus jon CHEVROLAT, 1860.

= *Mecometopus ion*; BATES 1872 nec CHEVROLAT.

= *Mecometopus ionoides* BATES 1885 (Chontales: Santo Domingo: Syntypus).

Distribución : Nicaragua (Bates, 1872; Bates, 1880; Bates, 1885; Blackwelder, 1946; Chemsak & Linsley, 1982) (Chontales).

Mecometopus jansoni BATES, 1870.

Distribución : Nicaragua (Bates, 1870; Bates, 1872; Bates, 1880; Blackwelder, 1946; Duffy, 1960; Chemsak & Linsley, 1982) (Chontales: Santo Domingo: Syntypus; Matagalpa), Costa Rica, Panamá, Guiana, Guiana francesa.

Xilófago : Mimosaceae : *Pentaclethra*.

Mecometopus macilentus BATES, 1872.

Distribución : Nicaragua (Bates, 1872; Bates, 1880; Blackwelder, 1946; Chemsak & Linsley, 1982) (Chontales: Santo Domingo: Syntypus), Costa Rica, Panamá.

Megacyllene angulata (FABRICIUS, 1792).

= *Clytus cayennensis* LAPORTE & GORY 1835 [*Clytus*, *Cyllene*, *Megacyllene*].

= *Megacyllene caracasensis* CHEVROLAT 1861.

Distribución : Guatemala, Nicaragua (Bates, 1872; Bates, 1880; Blackwelder, 1946; Duffy, 1960) (Chontales), Costa Rica, Venezuela, Guiana, Guiana francesa.

Xilófago : ? : *Alexa*.

Megacyllene guttata (CHEVROLAT, 1860) [*Cyllene*, *Placosternus*].

Distribución : México, Guatemala, Nicaragua (Bates, 1872; Bates, 1880; Blackwelder, 1946) (Chontales), Costa Rica, Panamá.

Megacyllene sp.

Distribución : Nicaragua (León).

Megaderus stigma (LINNAEUS, 1758) [*Cerambyx*].

= *Megaderus latifasciatus* BATES 1870 (Chontales: Santo Domingo: Syntypus).

Distribución : Nicaragua (Bates, 1870; Bates, 1872; Bates, 1880; Blackwelder, 1946; Chemsak & Linsley, 1982) (León), Costa Rica, Panamá, Colombia, Venezuela, Guiana*, Brasil, Bolivia, Argentina.

Megapsyrassa xestioides (BATES, 1872) [*Nephalius*, *Aposphaerion*].

Distribución : México, Nicaragua (Bates, 1872; Bates, 1880; Blackwelder, 1946; Chemsak & Linsley, 1982) (Chontales: Santo Domingo: Syntypus), Costa Rica, Panamá.

Metaleptus angulatus (CHEVROLAT, 1834) [*Purpuricenus*].

= *Metaleptes marginellus* BATES 1872 (Nicaragua: Chontales: Santo Domingo: Syntypus).

= *Metaleptus binoculus* BATES 1872.

= *Metaleptus coccinatus* BATES 1872 (Nicaragua: Chontales: Santo Domingo: Syntypus).

Distribución : México*, Belize, Guatemala, Nicaragua (Bates, 1872; Bates, 1880; Blackwelder, 1946; Chemsak & Linsley, 1982) (Chontales, León), Costa Rica, Panamá.

Microsyrassa bimaculata (BATES, 1872) [*Periboeum*].

Distribución : Nicaragua (Bates, 1872; Bates, 1880; Blackwelder, 1946) (Chontales: Santo Domingo: Syntypus; Managua), Costa Rica.

Mionochroma novella (BATES, 1885) [*Callichroma*].

Distribución : Nicaragua (Bates, 1885; Blackwelder, 1946; Chemsak & Linsley, 1982) (Chontales: Santo Domingo: Syntypus).

Mionochroma vittata vittata (FABRICIUS, 1775) [*Callichroma*].

= *Callichroma assimilata* WHITE 1853.

= *Callichroma aurea* GMELIN 1790.

= *Callichroma ochropa* VOET 1778.

= *Callichroma rugicollis* GUERIN 1844.

= *Callichroma scitula* PASCOE 1866.

= *Callichroma viridiaurea* DEGEER 1775.

Distribución : Hispaniola, México, Belize, Guatemala, Honduras, Nicaragua (Maes & Téllez, 1988) (Managua), Costa Rica, Panamá, Colombia, Guiana, Guiana francesa, Brasil, Argentina.

Xilófago : Chrysobalanaceae : *Couepia*.

Poaceae : *Zea*.

Rubiaceae : *Coffea*.

Sapotaceae : *Pouteria*.

Miltesthus marginatus BATES, 1872.

= *Aulacoscapus ataxiiformis* LINSLEY, 1935.

Distribución : Nicaragua (Bates, 1872; Bates, 1880; Blackwelder, 1946) (Chontales: Santo Domingo: Syntypus), Costa Rica, Panamá.

Neoclytus beltianus BATES, 1885.

= *Neoclytus lebasii* BATES 1872 nec CHEVROLAT.

Distribución : Nicaragua (Bates, 1872; Bates, 1880; Bates, 1885; Blackwelder, 1946; Chemsak & Linsley, 1982) (Chontales: Santo Domingo: Syntypus).

Neoclytus cacticus (CHEVROLAT, 1860) [*Clytus*].

= *Neoclytus rufus*; BATES 1872 nec OLIVIER (Nicaragua: Chontales: Santo Domingo).

Distribución : México, Belize, Guatemala, Honduras*, El Salvador, Nicaragua (Bates, 1872; Bates, 1880; Blackwelder, 1946; Duffy, 1960) (Chontales, León), Costa Rica, Panamá.

Xilófago : Zygophyllaceae : *Guaiacum*.

Neoclytus sp.

Distribución : Nicaragua (Maes & Téllez, 1988; Maes, 1992) (Zelaya).

Fitófago : Moraceae : *Ficus*.

Poaceae : *Sorghum*.

Neocompsa squalida (THOMSON, 1867).

Distribución : México, Guatemala, Nicaragua (Martins, 1970), Costa Rica, Panamá, Colombia, Venezuela.

Neocompsa textilis (THOMSON, 1865) [*Ibidion*, *Compsa*].

Distribución : Nicaragua (Bates, 1872; Bates, 1880; Blackwelder, 1946), Costa Rica*, Panamá.

Neoperiboeum villosulum (BATES, 1872) [*Periboeum*].

Distribución : México, Nicaragua (Bates, 1872; Bates, 1880; Blackwelder, 1946) (Chontales: Santo Domingo: Syntypus), Costa Rica, Panamá.

Nephalioides nigriventris (BATES, 1874) [*Nephalius*, *Stizocera*].

Distribución : México, Honduras, Nicaragua (Bates, 1874; Bates, 1880; Blackwelder, 1946; Chemsak & Linsley, 1982) (Chontales: Santo Domingo: Syntypus; León).

Nephalioides rutilus (BATES, 1872) [*Nephalius*, *Stizocera*].

Distribución : México, Nicaragua (Bates, 1872; Bates, 1880; Blackwelder, 1946) (Chontales: Santo Domingo: Syntypus).

Neotrichophoroides decipiens BATES, 1880 [*Trichophorus*].

Distribución : Honduras*, Nicaragua (Chemsak & Linsley, 1982).

Obrium albifasciatum BATES, 1872.

Distribución : México, Nicaragua (Bates, 1872; Bates, 1880; Blackwelder, 1946) (Chontales: Santo Domingo: Syntypus), Costa Rica.

Odontocera clara BATES, 1873.

= *Odontocera carinicollis* LINSLEY, 1934.

Distribución : México, Nicaragua (Bates, 1873; Bates, 1874; Bates, 1880; Blackwelder, 1946; Chemsak & Linsley, 1982) (Chontales: Santo Domingo: Syntypus), Costa Rica.

Odontocera fasciata (OLIVIER, 1795) [*Necydalis*].

= *Odontocera vitrea* SERVILLE 1833.

= *Odontocera chrysozona* WHITE 1855.

Distribución : Nicaragua (León), Panamá, Guiana, Brasil, Argentina.

Odontocera monostigma (BATES, 1869) [*Agaone*].

Distribución : Nicaragua (Bates, 1869; Bates, 1872; Bates, 1873; Bates, 1880; Blackwelder, 1946; Chemsak & Linsley, 1982) (Chontales: Santo Domingo: Syntypus), Costa Rica, Panamá.

Ommata aegrota (BATES, 1872) [*Odontocera*].

Distribución : Nicaragua (Bates, 1872; Bates, 1873; Bates, 1880; Blackwelder, 1946; Chemsak & Linsley, 1982) (Chontales: Santo Domingo: Syntypus).

Ommata beltiana BATES, 1872.

Distribución : Nicaragua (Bates, 1872; Bates, 1880; Blackwelder, 1946; Chemsak & Linsley, 1982) (Chontales: Santo Domingo: Syntypus), Costa Rica.

Ommata cyanipennis BATES, 1872.

Distribución : Nicaragua (Bates, 1872; Bates, 1880; Blackwelder, 1946; Chemsak & Linsley, 1982) (Chontales: Santo Domingo: Syntypus).

Ornithia mexicana mexicana (STURM, 1843) [*Ozodes*].

= *Trichophorus chevrolati* GUERIN 1844 [*Ornithia*].

Distribución : México, Guatemala, Honduras, Nicaragua (Bates, 1872; Bates, 1880; Blackwelder, 1946; Maes & Téllez, 1988) (Chontales, Managua), Panamá.

Xilófago : Poaceae : *Zea*.

Rubiaceae : *Coffea*.

Orwellion gibbulum gibbulum (BATES, 1880).

Distribución : México, Honduras, Nicaragua (Skiles, 1985) (Managua), Costa Rica.

Oxymerus aculeatus lebasii DUPONT, 1838.

Distribución : México, Nicaragua (Huedepohl, 1979), Costa Rica, Aruba, Curaçao, Venezuela, Colombia.

Ozodes multituberculata BATES, 1870.

Distribución : Nicaragua (Bates, 1870; Bates, 1872; Bates, 1880; Blackwelder, 1946; Duffy, 1960; Chemsak & Linsley, 1982) (Chontales: Santo Domingo: Syntypus), Panamá.

Xilófago : Vochysiaceae : *Vochysia*.

Ozodes xanthophasma BATES, 1872.

Distribución : Nicaragua (Bates, 1872; Bates, 1880; Blackwelder, 1946; Chemsak & Linsley, 1982) (Chontales: Santo Domingo: Syntypus), Panamá, Brasil.

Parastizocera procera (ERICHSON, 1848).

= *Stizocera rubricollis* FISHER 1944.

Distribución : México*, Nicaragua (Bates, 1872; Bates, 1880; Blackwelder, 1946) (Chontales), ?Colombia, Venezuela.

Parevander nobilis (BATES, 1872) [*Evander*].

Distribución : México, Nicaragua (Bates, 1872; Belt, 1874; Bates, 1880; Blackwelder, 1946; Chemsak & Linsley, 1982) (Chontales: Santo Domingo: Syntypus).

Peranoplium undulatum (BATES, 1880) [*Hypermallus*, *Elaphidion*].

Distribución : México*, Nicaragua (Blackwelder, 1946), Costa Rica.

Periboeum sp.

Distribución : Nicaragua (Managua, León).

Phespia corinna (PASCOE, 1866) [*Odontocera*, *Charis*].

Distribución : Nicaragua (Bates, 1872; Bates, 1873; Bates, 1880; Blackwelder, 1946; Chemsak & Linsley, 1982) (Chontales), Costa Rica, Panamá, Colombia*.

Placosternus crinicornis (CHEVROLAT, 1860) [*Cyllene*, *Megacyllene*].

= *Placosternus sanguinipes* CHEVROLAT 1860.

= *Placosternus similiguttata* CHEVROLAT 1861.

Distribución : Hawái, ?Jamaica, México*, Guatemala, Honduras, Nicaragua (Bates, 1885; Blackwelder, 1946; Maes & Téllez, 1988) (Chontales, Boaco, Managua, Masaya), Costa Rica, Panamá.

Xilófago : Poaceae : *Zea*, *Sorghum*.

Rubiaceae : *Coffea*.

Platyarthron chilense (THOMSON, 1860) [*Coelomarthron*].

= *Coelarthron quadrinotatum* BATES 1869 [*Coelomarthron*] (Nicaragua: Chontales: Santo Domingo: Syntypus).

Distribución : Nicaragua (Bates, 1869; Bates, 1872; Bates, 1880; Blackwelder, 1946; Chemsak & Linsley, 1982) (Chontales), ?Chile*.

Platyarthron laterale BATES, 1885.

Distribución : Nicaragua (Bates, 1885; Blackwelder, 1946; Chemsak & Linsley, 1982) (Syntypus), Costa Rica.

Pleuromenus baccifer BATES, 1872.

Distribución : México, Guatemala, Nicaragua (Bates, 1872; Bates, 1880; Blackwelder, 1946; Chemsak & Linsley, 1982) (Chontales: Santo Domingo: Syntypus), Costa Rica.

Plinthocoelium xanthogastra (BATES, 1880) [*Callichroma*].

= *Callichroma columbianum*; BATES 1872 nec GUERIN (Nicaragua: Chontales: Santo Domingo).

Distribución : Nicaragua (Bates, 1872; Bates, 1880; Blackwelder, 1946; Chemsak & Linsley, 1982) (Chontales: Santo Domingo: Syntypus; León).

Poeciloxestia sagittaria BATES, 1872) [*Xestia*, *Coleoxestia*].

Distribución : Nicaragua (Bates, 1872; Bates, 1880; Blackwelder, 1946; Chemsak & Linsley, 1982) (Chontales: Santo Domingo: Syntypus), Brasil.

Psyrassa subpicea (WHITE, 1853) [*Stizocera*].

Distribución : Honduras*, Nicaragua (reporte nuevo) (León).

Psyrassa testacea LINSLEY, 1935.

Distribución : Nicaragua (reporte nuevo) (Managua, Boaco), Costa Rica, Panamá.

Psyrassa sp.

Distribución : Nicaragua (Maes & Téllez, 1988) (Estelí).
Fitófago : Fabaceae : *Phaseolus*.

Pygmodeon ditelum (BATES, 1872) [*Heterachthes*, *Ibidion*].

Distribución : Nicaragua (Bates, 1872; Bates, 1880; Blackwelder, 1946; Martins, 1970; Chemsak & Linsley, 1982) (Chontales: Santo Domingo: Syntypus), Costa Rica, Panamá, ?Brasil.

Pygmodeon obtusum (BATES, 1874) [*Heterachthes*, *Ibidion*]

= *Heterachthes obtusus segregatum* BATES 1885.

Distribución : México, Guatemala, Nicaragua (Bates, 1874; Bates, 1880; Blackwelder, 1946; Martins, 1970) (Chontales: Santo Domingo: Syntypus), Costa Rica.

Rhinotragus longicollis BATES, 1880.

= *Rhinotragus apicalis*; BATES 1872 nec GUERIN (Nicaragua: Chontales: Santo Domingo).

Distribución : Nicaragua (Bates, 1872; Bates, 1880; Blackwelder, 1946; Chemsak & Linsley, 1982) (Chontales: Santo Domingo: Syntypus).

Rhopalophora cupricollis GUERIN, 1844.

Distribución : México*, Nicaragua (Bates, 1872; Bates, 1874; Bates, 1880; Blackwelder, 1946; Chemsak & Linsley, 1982) (Chontales), Costa Rica.

Rhoipalophora rubecula BATES, 1880.

= *Rhopalophora venezuelensis*; BATES 1872.

Distribución : Guatemala, Nicaragua (Bates, 1872; Bates, 1874; Bates, 1880; Blackwelder, 1946) (Chontales: Santo Domingo: Syntypus), Costa Rica.

Schwarzerion cyanomelas (WHITE, 1853) [*Callichroma*].

Distribución : Guatemala*, Nicaragua (Bates, 1872; Bates, 1880; Blackwelder, 1946; Chemsak & Linsley, 1982) (Chontales).

Schwarzerion holochlorum holochlorum (BATES, 1872) [*Callichroma*].

= *Callichroma opiparum* BATES, 1874 (Nicaragua: Chontales: Javalí: Syntypus).

= *Callichroma euthalia* BATES 1879.

= *Callichroma carinatum* SCHMIDT 1924.

Distribución : Guatemala, Nicaragua (Bates, 1872; Bates, 1874; Bates, 1880; Blackwelder, 1946; Chemsak & Linsley, 1982) (Chontales: Santo Domingo: Syntypus; Managua, Masaya, León, Matagalpa), Costa Rica, Panamá, Colombia, Venezuela.

Smodicum clancularium MARTINS, 1975.

Distribución : México*, Nicaragua (reporte nuevo) (León).

Sphallenopsis pilosovittata (BATES, 1872) [*Xestia*, *Coleoxestia*].

Distribución : Nicaragua (Bates, 1872; Bates, 1880; Blackwelder, 1946) (Chontales: Santo Domingo: Syntypus), Panamá.

Sphallotrichus robustum (BATES, 1870) [*Sphallenum*].

Distribución : Nicaragua (Bates, 1870; Bates, 1872; Bates, 1880; Blackwelder, 1946; Chemsak & Linsley, 1982) (Chontales: Santo Domingo: Syntypus), Costa Rica, Guiana.

Sphenothecus trilineatus DUPONT, 1838.

Distribución : México*, Guatemala, Nicaragua (Maes & Téllez, 1988), Costa Rica.

Fitófago : Rutaceae : *Citrus*.

Stenobatyle eburata (CHEVROLAT, 1862) [*Entomosterna*, *Parabatyle*].

= *Entomosterna trucidata* CHEVROLAT, 1862 [*Parabatyle*].

= *Entomosterna uncostata* CASEY 1912.

Distribución : México*, Nicaragua (Bates, 1873; Bates, 1874; Bates, 1880; Blackwelder, 1946; Chemsak, 1980) (Chontales), Costa Rica.

Nectarívoro : Euphorbiaceae : *Croton*, *Jatropha*.

Loganiaceae : *Buddleia*.

? : *Donneilsmithia*.

Stenosphenus langurioides wappesi GIESBERT & CHEMSAK, 1989.

Distribución : México*, Nicaragua (reporte nuevo) (León).

Stenosphenus ochraceus ochraceus BATES, 1872.

Distribución : México, Guatemala, Nicaragua (Bates, 1872; Bates, 1880; Blackwelder, 1946; Chemsak, 1967; Giesbert & Chemsak, 1989) (Chontales: Santo Domingo: Syntypus), Costa Rica.

En madera muerta de ? : *Forsteria*.

Nectarívoro : Apocynaceae : *Forsteronia*.

Euphorbiaceae : *Croton*.

Flacourtiaceae : *Casearia*.

Stenosphenus trispinosus BATES, 1872.

= *Stenosphenus ebeninus* BATES 1872 (Nicaragua: Chontales: Santo Domingo: Syntypus).

= *Stenosphenus erythroderus* BATES 1885.

Distribución : México*, Guatemala, El Salvador, Nicaragua (Bates, 1872; Bates, 1880; Blackwelder, 1946; Chemsak & Linsley, 1982; Giesbert & Chemsak, 1989) (Chontales), Costa Rica.

Xilófago : Tiliaceae : *Heliocarpus*.

Nectarívoro : Euphorbiaceae : *Croton*.

Stenophenus sp.

Distribución : Nicaragua (Masaya, Ometepe).

Stenygra histrio histrio SERVILE, 1834.

Distribución : México*, Guatemala, Honduras, Nicaragua (Bates, 1872; Bates, 1880; Blackwelder, 1946; King & Saunders, 1984; Maes & Téllez, 1988) (Managua, Chontales, Boaco, Granada, Chinandega, León, Jinotega, Ometepe), Costa Rica.

Xilófago : Convolvulaceae : *Ipomoea*.

Cucurbitaceae : *Cucumis*.

Fabaceae : *Phaseolus*, *Vigna*.

Malvaceae : *Gossypium*.

Poaceae : *Zea*, *Sorghum*.

Solanaceae : *Capsicum*.

Stizocera rugicollis (GUERIN, 1844) [*Sphaerion*, *Nephalius*].

Distribución : Nicaragua (Bates, 1872; Bates, 1880; Blackwelder, 1946; Chemsak & Linsley, 1982) (Chontales), Panamá, Colombia*.

Styliceps striatus (VOET, 1778).

= *Styliceps sericata* PASCOE 1859.

= *Styliceps amazonica* THOMSON 1860.

= *Styliceps sericans* LACORDAIRE 1869.

Distribución : Nicaragua (Bates, 1872; Bates, 1880; Blackwelder, 1946; Chemsak & Linsley, 1982) (Chontales), Guiana francesa, Brasil.

Tanyochraethes ochrozona BATES, 1885 [*Clytanthus*, *Anthoboscus*].

Distribución : México, Guatemala, Nicaragua (reporte nuevo) (Managua, Granada, Boaco), Costa Rica.

Taranomis bivittata bivittata (DUPONT, 1838) [*Sphenothecus*].

= *Leptocera bilineata* GORY 1839 [*Taranomis*].

Distribución : USA, México*, Nicaragua (Maes & Téllez, 1988) (Matagalpa).

Xilófago : Mimosaceae : *Prosopis*.

Rubiaceae : *Coffea*.

Tethlimmena aliena BATES, 1872.

Distribución : Nicaragua (Bates, 1872; Bates, 1880; Blackwelder, 1946; Chemsak & Linsley, 1982) (Chontales: Santo Domingo: Syntypus; Nueva Segovia), Costa Rica, Panamá.

Thoracibidion buquetii (THOMSON, 1867) [*Ibidion*].

= *Ibidion griseicollis* BATES 1872.

Distribución : México, Nicaragua (Bates, 1872; Bates, 1880; Blackwelder, 1946) (Chontales: Santo Domingo: Syntypus), Costa Rica, Panamá.

Trachyderes elegans elegans DUPONT, 1836.

= *Trachyderes subpilosa* BATES 1872.

= *Trachyderes eximius* BATES 1885.

Distribución : México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua (Bates, 1872; Bates, 1880; Blackwelder, 1946; Huedepohl, 1985) (Chontales: Santo Domingo: Syntypus), Costa Rica, Panamá.

Trachyderes maxillosus (DUPONT, 1834) [*Dendrobias*].

Distribución : Martinica*, Nicaragua (Bates, 1872; Bates, 1880; Blackwelder, 1946; Chemsak & Linsley, 1982) (Chontales).

Trachyderes succinctus (LINNAEUS, 1758) [*Cerambyx*].

- = *Trachyderes transversalis* DUPONT 1836.
- = *Trachyderes intermedius* DUPONT 1836.
- = *Trachyderes rubripes* DUPONT 1836.
- = *Trachyderes subfasciatus* DUPONT 1836.
- = *Trachyderes interruptus* DUPONT 1838.
- = *Trachyderes cayennensis* DUPONT 1838.
- = *Trachyderes zonarius* HOUTTUYN 1866.
- = *Trachyderes nigricornis* AURIVILLIUS 1908.

Distribución : Virgenes, ?Guadalupe, Martinica, Granada, Nicaragua (Bates, 1872; Bates, 1880; Blackwelder, 1946; Maes & Téllez, 1988; Maes, 1992) (Chontales, Managua, Matagalpa), Costa Rica, Panamá, Colombia, Trinidad, Venezuela, Guiana, Ecuador, Brasil, Argentina.

Xilófago : Apocynaceae : *Aspidosperma*.

Brassicaceae : *Brassica*.

Caesalpinaceae : *Caesalpinia*.

Fabaceae : *Erythrina*, *Mora*.

Lauraceae : *Persea*.

Mimosaceae : *Inga*, *Mimosa*.

Moraceae : *Ficus*, *Morus*.

Myrtaceae : *Eucalyptus*, *Psidium*.

Rubiaceae : *Coffea*.

Rutaceae : *Citrus*.

Sterculiaceae : *Theobroma*.

Tristachycera viridis BATES, 1872.

Distribución : Nicaragua (Bates, 1872; Bates, 1880; Blackwelder, 1946; Chemsak & Linsley, 1982) (Chontales: Santo Domingo: Syntypus), Panamá.

Tropidion carinicolle (BATES, 1872) [*Ibidion*].

Distribución : Nicaragua (Bates, 1872; Bates, 1880; Blackwelder, 1946; Chemsak & Linsley, 1982) (Chontales: Santo Domingo: Syntypus), Panamá.

Xenochroma azurea DEMETS, 1976.

Distribución : México, Nicaragua (Demets, 1976) (Chontales), Costa Rica.

SUBFAMILIA LEPTURINAE.

Chloriolaus sp.

Nicaragua (Granada).

Chontalia cyanicollis BATES, 1872.

Distribución : Nicaragua (Bates, 1872; Bates, 1880; Blackwelder, 1946;
Chemsak & Linsley, 1982) (Chontales: Santo Domingo: Syntypus).

Choriolaus nigella (BATES, 1872) [*Ophistomis*].

Distribución : Nicaragua (Bates, 1872; Bates, 1880; Blackwelder, 1946;
Chemsak & Linsley, 1982) (Chontales: Santo Domingo: Syntypus).

Cyphonotida laevicollis laevicollis (BATES, 1880) [*Ophistomis*].

Distribución : Guatemala*, Honduras, Nicaragua (reporte nuevo) (Jinotega).

Pseudophistomis pallida (BATES, 1872) [*Ophistomis*].

Distribución : Nicaragua (Bates, 1872; Bates, 1880; Blackwelder, 1946;
Chemsak & Linsley, 1982) (Chontales: Santo Domingo: Syntypus).

Pseudotypocerus rufiventris (BATES, 1872) [*Ophistomis*].

= *Ophistomis pubipennis* BATES 1885.

Distribución : México, Nicaragua (Bates, 1872; Bates, 1880; Blackwelder,
1946; Chemsak & Linsley, 1981; Chemsak & Linsley, 1982)
(Chontales: Santo Domingo: Syntypus).

Strangalia belti (BATES, 1872) [*Ophistomis*].

Distribución : Nicaragua (Bates, 1872; Bates, 1880; Blackwelder, 1946;
Chemsak & Linsley, 1982) (Chontales: Santo Domingo: Syntypus).

Strangalia picticornis (BATES, 1869) [*Ophistomis*].

Distribución : Nicaragua (Bates, 1869; Bates, 1872; Bates, 1880;
Blackwelder, 1946; Chemsak & Linsley, 1982; Giesbert, 1985)
(Chontales: Santo Domingo: Syntypus), Costa Rica, Panamá.

Strangalia sp.

= *Ophistomis* sp.

Nicaragua (León).

SUBFAMILIA DISTENIINAE.

Los Disteniinae son actualmente considerados como una familia, por razones de homogeneidad del trabajo, la dejamos como subfamilia.

Distenia chrysostigma BATES, 1872.

Distribución : Nicaragua (Bates, 1872; Bates, 1880; Blackwelder, 1946;
Chemsak & Linsley, 1982) (Chontales: Santo Domingo: Syntypus).

Distenia cribristernis BATES, 1885.

= *Distenia cribristernis chontalensis* BATES 1885 (Chontales: Santo Domingo: Syntypus).

Distribución : Nicaragua (Bates, 1885; Blackwelder, 1946) (Chontales), Panamá*.

Distenia fastuosa PASCOE, 1871.

Distribución : Nicaragua (Bates, 1872; Bates, 1880; Blackwelder, 1946; Chemsak & Linsley, 1982) (Chontales), Panamá, Colombia.

Distenia geniculata BATES, 1872.

Distribución : México, Guatemala, Nicaragua (Bates, 1872; Bates, 1880; Blackwelder, 1946) (Chontales: Santo Domingo: Syntypus), Costa Rica, Panamá.

Distenia hogei BATES, 1885.

Distribución : México*, Nicaragua (Maes & Téllez, 1988; Maes, 1992) (Zelaya).

Fitófago : Meliaceae : *Guarea*.

Distenia phaeocera BATES, 1880.

= *Distenia rufipes*; BATES 1872 nec BATES (Nicaragua: Chontales: Santo Domingo).

Distribución : Nicaragua (Bates, 1872; Bates, 1880; Blackwelder, 1946; Chemsak & Linsley, 1982) (Chontales: Santo Domingo: Syntypus).

Distenia pilatei CHEVROLAT, 1857.

Distribución : Nicaragua (Bates, 1872; Bates, 1880; Blackwelder, 1946), Panamá, ?Colombia.

Distenia sp.

Distribución : Nicaragua (Maes, 1992) (Jinotega, Zelaya).

Paracometes pulcherrima (BATES, 1872) [Cometes].

Distribución : Nicaragua (Bates, 1872; Bates, 1880; Blackwelder, 1946; Chemsak & Linsley, 1982) (Chontales: Santo Domingo: Syntypus), Costa Rica, Panamá.

SUBFAMILIA LAMIINAE.

Acanthoderes circumflexa DU VAL, 1857.

= *Acanthoderes meteorica* GISTL 1857.

Distribución : Cuba*, Puerto Rico, México, Guatemala, Nicaragua (Bates, 1872; Bates, 1880; Blackwelder, 1946; Maes & Téllez, 1988) (Chontales, Boaco, Granada, León, Managua), Costa Rica, Panamá, Colombia, Venezuela.

Xilófago : Anacardiaceae : *Mangifera*.

Acanthoderes bivitta (WHITE, 1855) [Steirastoma].

= *Acanthoderes fuliginosus* THOMSON 1865.

Distribución : Nicaragua (Bates, 1874; Bates, 1880; Blackwelder, 1946; Chemsak & Linsley, 1982) (Chontales), Panamá, Guiana francesa, Brasil.

Acanthoderes inquinata BATES, 1872.

Distribución : Nicaragua (Bates, 1872; Bates, 1880; Blackwelder, 1946; Chemsak & Linsley, 1982) (Chontales: Santo Domingo: Syntypus), Costa Rica, Panamá.

Acanthoderes laevicollis BATES, 1872.

Distribución : Nicaragua (Bates, 1872; Bates, 1880; Blackwelder, 1946; Chemsak & Linsley, 1982) (Chontales: Santo Domingo: Syntypus), Costa Rica, Panamá.

Acanthoderes rubripes BATES, 1872.

Distribución : Nicaragua (Bates, 1872; Bates, 1880; Blackwelder, 1946; Chemsak & Linsley, 1982) (Chontales: Santo Domingo: Syntypus), Panamá.

Acrocinus longimanus (LINNAEUS, 1758) [*Cerambyx*, *Prionus*].

arlequín, harlequin beetle.

= *Acrocinus pictus* LEACH 1815.

Distribución : Barbados, México, Belize, Guatemala, Nicaragua (Bates, 1874; Bates, 1880; Blackwelder, 1946; Duffy, 1960; Maes & Téllez, 1988) (Chontales, Chinandega, Managua, Carazo, Boaco), Costa Rica, Panamá, Venezuela, Guiana, Brasil, Argentina.

Xilófago : Bombacaceae : *Chorisia*.

Caryocaraceae : *Caryocar*.

Fabaceae : *Lonchocarpus*, *Enterolobium*.

Lauraceae : *Persea*.

Mimosaceae : *Inga*.

Moraceae : *Ficus*, *Castilla*, *Brosimum*, *Artocarpus*, *Chlorophora*,

Urostigma. Sterculiaceae : *Guazuma*.

? : *Parahancornia*.

- Adesmus bifasciatus* (BATES, 1869) [*Amphionycha*].
Distribución : Nicaragua (Bates, 1869; Bates, 1872; Bates, 1881; Blackwelder, 1946; Chemsak & Linsley, 1982) (Chontales: Santo Domingo: Syntypus), Costa Rica.
- Adesmus fraudatrix* (BATES, 1881) [*Amphionycha*].
= *Adesmus lineata*; BATES 1872.
Distribución : Nicaragua (Bates, 1874; Bates, 1881; Blackwelder, 1946) (Chontales: Santo Domingo: Syntypus), Costa Rica.
- Adesmus princeps* (BATES, 1872) [*Amphionycha*].
Distribución : Nicaragua (Bates, 1872; Belt, 1874; Bates, 1881; Blackwelder, 1946; Chemsak & Linsley, 1982) (Chontales: Santo Domingo: Syntypus), Costa Rica.
- Adesmus sp.*
= *Amphionychus sp.*
Distribución : Nicaragua (Maes & Téllez, 1988) (Managua).
Fitófago : Poaceae : *Zea*.
- Adetus analis* (HALDEMAN, 1847) [*Polyopsis*].
= *Adetus muticus* THOMSON 1857 [*Agénopsis*].
= *Agénopsis mexicanus* THOMSON 1868.
= *Agénopsis pygmaeus* BATES 1866.
Distribución : México*, Belize, Guatemala, Honduras, Nicaragua (Bates, 1872; Bates, 1880; Blackwelder, 1946; Duffy, 1960; Maes & Téllez, 1988) (Chontales, Managua), Panamá, Guiana francesa, Brasil, Argentina.
Xilófago : Cucurbitaceae : *Sechium*.
Musaceae : *Musa*.
- Adetus binotatus* (THOMSON, 1868) [*Tautoclínes*].
Distribución : México*, Belize, Nicaragua (Bates, 1872; Bates, 1880; Blackwelder, 1946; Chemsak & Linsley, 1982) (Chontales), Costa Rica, Panamá.
- Adetus costicollis* BATES, 1872.
= *Tautoclínes scissicauda* BATES, 1874 [*Adetus*] (Nicaragua: Chontales: Santo Domingo: Syntypus).
Distribución : México, Guatemala, Nicaragua (Bates, 1872; Bates, 1874; Bates, 1880; Blackwelder, 1946) (Chontales: Santo Domingo: Syntypus), Costa Rica, Panamá.

Adetus griseicauda (BATES, 1872) [*Tautoclina*]

Distribución : Nicaragua (Bates, 1872; Bates, 1880; Blackwelder, 1946; Chemsak & Linsley, 1982) (Chontales: Santo Domingo: Syntypus), Costa Rica, Panamá.

Adetus pictus BATES, 1880.

Distribución : Nicaragua (Bates, 1880; Blackwelder, 1946) (Chontales: Santo Domingo: Syntypus).

Aerenea impetiginosa THOMSON, 1858.

Distribución : Guatemala, Nicaragua (Bates, 1872; Bates, 1880; Blackwelder, 1946) (Chontales), Costa Rica, Panamá, Colombia, Venezuela.

Aerenicopsis championi BATES, 1885.

Distribución : México, Nicaragua (reporte nuevo), Costa Rica, Panamá*.

Alcidius humeralis (PERTY, 1832).

= *Probatius mexicanus* THOMSON 1860.

Distribución : México*, Belize, Guatemala, Nicaragua (Bates, 1872; Bates, 1881; Blackwelder, 1946) (Chontales), Costa Rica, Panamá, Venezuela, Guiana francesa, Brasil, Argentina.

Alphus cavifrons BATES, 1872.

= *Alphus cavifrons batesi* AURIVILLIUS 1923 (Chontales: Santo Domingo: Syntypus).

Distribución : Nicaragua (Bates, 1872; Bates, 1880; Aurivillius, 1923; Blackwelder, 1946; Chemsak & Linsley, 1982) (Chontales: Santo Domingo: Syntypus), Costa Rica, Panamá.

Amillarus apicalis THOMSON, 1860.

= *Amillarus erythroderus* CHEVROLAT 1861.

= *Amillarus mutabilis* BATES 1866.

Distribución : Nicaragua (Bates, 1880; Blackwelder, 1946) (Chontales, Jinotega, León), Costa Rica, Panamá, Colombia*, Venezuela, Brasil.

Amphicnaeia brevivittis BATES, 1872.

Distribución : Nicaragua (Bates, 1872; Bates, 1880; Blackwelder, 1946; Chemsak & Linsley, 1982) (Chontales: Santo Domingo: Syntypus), Costa Rica.

Amphicnaeia crustulata BATES, 1872.

= *Amphicnaeia bivittata* MELZER 1933.

Distribución : Nicaragua (Bates, 1872; Bates, 1880; Blackwelder, 1946; Chemsak & Linsley, 1982) (Chontales: Santo Domingo: Syntypus), Costa Rica, Panamá.

Anisocerus palliatus WHITE, 1855.

= *Anisocerus personatus* BATES 1869 (Nicaragua: Chontales: Santo Domingo: Syntypus).

Distribución : Guatemala, Nicaragua (Bates, 1869; Bates, 1872; Bates, 1880; Blackwelder, 1946) (Chontales), Costa Rica, Panamá.

Anisocerus sp.

Distribución : Nicaragua (León).

Anisopodus hamaticollis BATES, 1872.

Distribución : México, Belize, Guatemala, Nicaragua (Bates, 1872; Bates, 1881; Blackwelder, 1946) (Chontales: Santo Domingo: Syntypus), Costa Rica, Panamá.

Anisopodus hiebei MARTINS, 1974.

= *Anisopodus phalangodes*; BATES nec ERICHSON 1872.

Distribución : México, Guatemala, Nicaragua (Bates, 1872; Bates, 1881; Blackwelder, 1946; Duffy, 1960) (Chontales), Panamá.

Xilófago : Moraceae : *Ficus*.

? : *Pera glabrata*.

Anisopodus scriptipennis BATES, 1872.

Distribución : México, Guatemala, Nicaragua (Bates, 1872; Bates, 1881; Blackwelder, 1946) (Chontales: Santo Domingo: Syntypus), Costa Rica, Panamá.

Antecurisa apicalis (BATES, 1864).

= *Astynomus setiger* BATES 1872 [*Astyochus*].

= *Antecurisa picta* GILMOUR 1960.

Distribución : México, Guatemala, Nicaragua (Bates, 1872; Bates, 1881; Blackwelder, 1946) (Chontales: Santo Domingo: Syntypus).

Antodice cretata BATES, 1872.

Distribución : México, Guatemala, Nicaragua (Bates, 1872; Bates, 1881; Blackwelder, 1946; Chemsak & Linsley, 1982) (Chontales: Santo Domingo: Syntypus), Costa Rica, Panamá.

Antodice nympha BATES, 1881.

Distribución : México, Guatemala, Nicaragua (reporte nuevo) (León), Costa Rica.

Arixuna prolixus (BATES, 1872) [*Hemilophus*].

Distribución : Nicaragua (Bates, 1872; Bates, 1881; Blackwelder, 1946; Chemsak & Linsley, 1982) (Chontales: Santo Domingo: Syntypus), Costa Rica, Panamá.

Asemolea minuta (BATES, 1872) [*Callia*].

Distribución : Nicaragua (Bates, 1872; Bates, 1881; Blackwelder, 1946; Chemsak & Linsley, 1982) (Chontales: Santo Domingo: Syntypus), Costa Rica.

Ataxia lineata (FABRICIUS, 1792).

= *Ataxia annulata* FABRICIUS 1801.

Distribución : Nicaragua (reporte nuevo) (León), Suramerica.

Ataxia rufitarsis (BATES, 1880) [*Parysatis*].

Distribución : Nicaragua (Bates, 1880; Blackwelder, 1946; Chemsak & Linsley, 1982) (Chontales: Santo Domingo: Syntypus).

Atimiola guttulata BATES, 1880.

Distribución : México, Belize, Guatemala, Nicaragua (reporte nuevo) (Jinotega), Costa Rica.

Atrypanius conspersus (GERMAR, 1824) [*Lamia*].

= *Leiopus varipennis* SERVILE 1835.

Distribución : México, Guatemala, Nicaragua (Bates, 1864; Bates, 1872; Bates, 1881; Blackwelder, 1946) (Chontales), Costa Rica, Panamá, Guiana francesa, Brasil*.

Atrypanius implexus (ERICHSON, 1847).

= *Nyssodrys sedatus* BATES 1864 [*Atrypanius*].

Distribución : México, Guatemala, Nicaragua (Bates, 1881; Blackwelder, 1946) (Chontales), Costa Rica, Panamá, Brasil*.

Atrypanius punctatellus (BATES, 1872) [*Nyssodrys*].

Distribución : México, Nicaragua (Bates, 1872; Bates, 1881; Blackwelder, 1946; Chemsak & Linsley, 1982) (Chontales: Santo Domingo: Syntypus), Costa Rica, Panamá.

Baryssinus chemsaki MONNE, 1985.

= *Baryssinus bilineatus*; BATES 1872 nec BATES (Nicaragua: Chontales: Santo Domingo).

Distribución : México, Guatemala, Nicaragua (Bates, 1872; Bates, 1881; Blackwelder, 1946) (Chontales), Costa Rica, Panamá.

Batesbeltia belti (BATES, 1872) [*Gymnocerus*].

Distribución : Nicaragua (Bates, 1872; Belt, 1874; Bates, 1880; Blackwelder, 1946; Chemsak & Linsley, 1982) (Chontales: Santo Domingo: Syntypus), Costa Rica.

Bebelis puncticollis FISHER, 1947.

Distribución : Nicaragua (Fisher, 1947; Chemsak & Linsley, 1982) (Syntypus).

Callia fulvocincta BATES, 1866.

Distribución : México, Guatemala, Nicaragua (Bates, 1872; Bates, 1881; Blackwelder, 1946) (Chontales), Costa Rica, Panamá, Brasil*.

Canidia cincticornis cincticornis (THOMSON, 1857) [*Dectes*].

Distribución : México, Guatemala, Nicaragua (Chemsak & Linsley, 1982; Maes & Téllez, 1988) (León, Managua, Masaya), Costa Rica*.

Xilófago : Poaceae : *Saccharum*.

Carneades delicia BATES, 1869.

Distribución : Nicaragua (Bates, 1869; Bates, 1872; Bates, 1881; Blackwelder, 1946; Chemsak & Linsley, 1982) (Chontales: Santo Domingo: Syntypus).

Carneades princeps BATES, 1872.

Distribución : Nicaragua (Bates, 1872; Bates, 1881; Blackwelder, 1946; Chemsak & Linsley, 1982) (Chontales: Santo Domingo: Syntypus), Costa Rica, Panamá.

Carneades superba BATES, 1869.

Distribución : Nicaragua (Bates, 1869; Bates, 1872; Belt, 1874; Bates, 1881; Blackwelder, 1946; Chemsak & Linsley, 1982) (Chontales: Santo Domingo: Syntypus), Costa Rica, Panamá.

Carphina arcifera BATES, 1872.

Distribución : México, Guatemala, Nicaragua (Bates, 1872; Bates, 1881; Blackwelder, 1946) (Chontales: Santo Domingo: Syntypus), Costa Rica, Panamá.

Carterica pygmaea BATES, 1881.

Distribución : Nicaragua (Bates, 1881; Blackwelder, 1946; Chemsak & Linsley, 1982) (Chontales: Santo Domingo: Syntypus), Costa Rica, Panamá.

Cephalodina crassiceps BATES, 1881 [*Amphionycha*].

= *Amphionycha capito*; BATES 1872 nec BATES (Nicaragua: Chontales: Santo Domingo).

Distribución : Nicaragua (Bates, 1872; Bates, 1881; Blackwelder, 1946; Chemsak & Linsley, 1982) (Chontales: Santo Domingo: Syntypus), Panamá.

Chalastinus rubrocinctus BATES, 1869.

Distribución : Nicaragua (Bates, 1869; Bates, 1872; Belt, 1874; Bates, 1880; Blackwelder, 1946; Chemsak & Linsley, 1982) (Chontales: Santo Domingo: Syntypus), Costa Rica.

Charoides lycimnia DILLON & DILLON, 1945.

= *Hypsioma picticornis*; BATES 1872 nec BATES.

Distribución : Granada, México, Guatemala, Nicaragua (Bates, 1872; Bates, 1880; Bates, 1885; Blackwelder, 1946) (Chontales, Rivas), Panamá.

Cirrhicera sallei THOMSON, 1857.

= *Cirrhicera sallaei*; BATES 1872 (Nicaragua: Chontales: Santo Domingo).

Distribución : México*, Guatemala, Nicaragua (Bates, 1872; Bates, 1881; Blackwelder, 1946) (Chontales), Costa Rica, Panamá.

Colobothea aleata BATES, 1885.

Distribución : Nicaragua (Bates, 1885; Blackwelder, 1946; Chemsak & Linsley, 1982) (Chontales: Santo Domingo: Syntypus), Costa Rica, Panamá.

Colobothea bitincta BATES, 1872.

Distribución : Nicaragua (Bates, 1872; Bates, 1881; Blackwelder, 1946; Chemsak & Linsley, 1982) (Chontales: Santo Domingo: Syntypus), Costa Rica, Panamá, Colombia.

Colobothea chontalensis BATES, 1872.

Distribución : Nicaragua (Bates, 1872; Bates, 1881; Blackwelder, 1946; Chemsak & Linsley, 1982) (Chontales: Santo Domingo: Syntypus), Costa Rica, Panamá.

Colobothea dispersa BATES, 1872.

Distribución : Nicaragua (Bates, 1872; Bates, 1881; Blackwelder, 1946; Chemsak & Linsley, 1982) (Chontales: Santo Domingo: Syntypus), Costa Rica, Panamá, Colombia.

Colobothea distincta PASCOE, 1866.

Distribución : México, Guatemala, Nicaragua (Bates, 1872; Bates, 1881; Blackwelder, 1946) (Chontales), Costa Rica, Panamá, Colombia*.

Colobothea hebraica BATES, 1865.

Distribución : México*, Guatemala, Nicaragua (Bates, 1872; Bates, 1881; Blackwelder, 1946; Chemsak & Linsley, 1982) (Chontales).

Colobothea ramosa BATES, 1872.

Distribución : México, Nicaragua (Bates, 1872; Bates, 1881; Blackwelder, 1946; Chemsak & Linsley, 1982) (Chontales: Santo Domingo: Syntypus).

Colobothea unilineata BATES, 1872.

Distribución : Nicaragua (Bates, 1872; Bates, 1881; Blackwelder, 1946; Chemsak & Linsley, 1982) (Chontales: Santo Domingo: Syntypus).

Cosmotoma fasciata FISHER, 1931.

= *Cosmotoma rubella* BATES 1872.

Distribución : Nicaragua (Bates, 1872; Bates, 1881; Blackwelder, 1946) (Chontales).

Cylicasta liturata FABRICIUS, 1801.

= *Trestonia terminata*; BATES 1872 nec BUQUET [*Cylicasta*].

= *Trestonia coarctata* BATES 1865.

Distribución : Nicaragua (Bates, 1872; Bates, 1881; Blackwelder, 1946) (Chontales), Panamá, Guiana francesa, Brasil.

Cymatonycha castanea BATES, 1874.

Distribución : México, Guatemala, Nicaragua (Bates, 1874; Bates, 1881; Blackwelder, 1946) (Chontales: Santo Domingo: Syntypus), Costa Rica, Panamá.

Cymatonycha sp.

Distribución : Nicaragua (Maes & Téllez, 1988) (Matagalpa).

Fitófago : Rubiaceae : *Coffea*.

Deliathis diluta GAHAN, 1892.

Distribución : México, Guatemala, El Salvador, Nicaragua (reporte nuevo) (Estelí).

Deliathis nivea BATES, 1869.

Distribución : Nicaragua (Bates, 1869; Bates, 1872; Belt, 1874; Bates, 1880; Blackwelder, 1946; Chemsak & Linsley, 1982) (Chontales: Santo Domingo: Syntypus; Jinotega), Costa Rica, Panamá.

Desmiphora canescens BATES, 1874.

= *Desmiphora obliquemaculata* BREUNING 1942 (Nicaragua: Syntypus).

Distribución : Nicaragua (Bates, 1874; Bates, 1880; Blackwelder, 1946; Chemsak & Linsley, 1982) (Chontales: Santo Domingo: Syntypus), Costa Rica.

Desmiphora cirrosa ERICHSON, 1847.

Distribución : México, Guatemala, Nicaragua (Bates, 1872; Bates, 1880; Blackwelder, 1946; Duffy, 1960) (Chontales), Panamá, Brasil, Perú, Argentina.

Xilófago : Platanaceae : *Platanus*.

Desmiphora fasciculata (OLIVIER, 1792) [*Cerambyx*, *Lamia*].

= *Desmiphora servillei* WHITE 1855.

= *Desmiphora gigantea* THOMSON 1860.

Distribución : México, Nicaragua (Bates, 1873; Bates, 1874; Bates, 1880; Blackwelder, 1946) (Chontales), Costa Rica, Panamá, Guiana francesa, Brasil.

Desmiphora hirticollis OLIVIER, 1795.

= *Desmiphora lanata* CHEVROLAT 1862.

= *Desmiphora mexicana* THOMSON 1860.

= *Desmiphora intricata* CASEY, 1913.

Distribución : Cuba, Granada, St. Vincent, México, Belize, Guatemala, Nicaragua (Bates, 1872; Bates, 1880; Blackwelder, 1946; Duffy, 1960) (Chontales, León), Costa Rica, Panamá, Colombia, Venezuela, Guiana francesa, Brasil, Argentina.

Xilófago : Euphorbiaceae : *Sapium*.

Desmiphora sp.

Distribución : Nicaragua (León).

Dorcasta borealis BREUNING, 1940.

Distribución : Nicaragua (Blackwelder, 1946; Chemsak & Linsley, 1982) (Syntypus).

Dorcasta lignea BATES, 1873.

Distribución : Belize, Nicaragua (Bates, 1885; Blackwelder, 1946) (Chontales), Panamá, Brasil*.

Dorcasta obtusa BATES, 1885.

Distribución : Cuba, St. Vincent, México*, Guatemala*, Nicaragua (reporte nuevo) (Matagalpa).

Eleothis abstrusus BATES, 1881 [*Leiopus*].

Distribución : Guatemala, Nicaragua (Bates, 1885; Blackwelder, 1946; Chemsak & Linsley, 1982), (Chontales).

Epectasis juncea NEWMAN, 1840.

= *Epectasis attenuata* BATES, 1866.

Distribución : México, Guatemala, Nicaragua (Bates, 1872; Bates, 1880; Blackwelder, 1946) (Chontales), Panamá, Brasil.

Epectasis sp.

Distribución : Nicaragua (Masaya).

Erana leuconoe BATES, 1881.

Distribución : Nicaragua (Bates, 1881; Blackwelder, 1946; Chemsak & Linsley, 1982) (Chontales: Santo Domingo: Syntypus), Costa Rica, Panamá*.

Erana pusilla BATES, 1874.

Distribución : México, Guatemala, Nicaragua (Bates, 1874; Bates, 1881; Blackwelder, 1946; Chemsak & Linsley, 1982) (Chontales: Santo Domingo: Syntypus; Jinotega), Costa Rica.

Esthlogena porosa BATES, 1872.

Distribución : México, Nicaragua (Bates, 1872; Bates, 1880; Blackwelder, 1946) (Chontales: Santo Domingo: Syntypus), Costa Rica, Panamá.

Estola ignobilis BATES, 1872.

Distribución : Puerto Rico, México, Belize, Guatemala, Nicaragua (Bates, 1872; Bates, 1880; Blackwelder, 1946) (Chontales: Santo Domingo: Syntypus), Costa Rica, Panamá.

Estola vittulata BATES, 1874.

Distribución : México, Belize, Guatemala, Nicaragua (Bates, 1874; Bates, 1880; Blackwelder, 1946) (Chontales: Santo Domingo: Syntypus), Costa Rica, Panamá.

Estola sp.

Distribución : Nicaragua (Maes & Téllez, 1988) (León).

Xilófago : Moraceae : *Ficus*.

Musaceae : *Musa*.

Rubiaceae : *Coffea*.

Estoloides costaricensis BREUNING, 1940.

Distribución : Nicaragua (Breuning, 1940; Chemsak & Linsley, 1982) (Syntypus), Costa Rica.

Estoloides perforata (BATES, 1872) [*Estola*].

Distribución : México, Belize, Guatemala, Nicaragua (Bates, 1872; Bates, 1880; Blackwelder, 1946) (Chontales: Santo Domingo: Syntypus), Costa Rica, Panamá, Venezuela.

Eudesmus grisescens SERVILE, 1835.

= *Eudesmus posticalis* GUERIN 1844.

Distribución : Nicaragua (Bates, 1872; Bates, 1880; Blackwelder, 1946) (Chontales), Brasil.

Eudesmus nicaraguensis BREUNING, 1958.

Distribución : Nicaragua (Breuning, 1958; Chemsak & Linsley, 1982) (Chontales: Santo Domingo: Syntypus).

Eulachnesia smaragdina BATES, 1872.

Distribución : Nicaragua (Bates, 1872; Bates, 1881; Blackwelder, 1946; Chemsak & Linsley, 1982) (Chontales: Santo Domingo: Syntypus), Costa Rica, Panamá.

Eumathes cuprascens BATES, 1874.

Distribución : Nicaragua (Bates, 1874; Bates, 1881; Blackwelder, 1946; Chemsak & Linsley, 1982) (Chontales: Santo Domingo: Syntypus), Costa Rica, Panamá.

Eupogonius flavocinctus BATES, 1872.

Distribución : Nicaragua (Bates, 1872; Bates, 1880; Blackwelder, 1946; Chemsak & Linsley, 1982) (Chontales: Santo Domingo: Syntypus), Costa Rica.

Eupogonius infimus (THOMSON, 1868).

= *Eupogonius subaeneus* BATES 1872.

Distribución : México, Belize, Guatemala, Nicaragua (Bates, 1872; Bates, 1880; Blackwelder, 1946) (Chontales: Santo Domingo: Syntypus), Costa Rica, Panamá.

Xylófago : *Cecropia*.

Eupogonius ursulus BATES, 1872.

Distribución : Nicaragua (Bates, 1872; Bates, 1880; Blackwelder, 1946; Chemsak & Linsley, 1982) (Chontales: Santo Domingo: Syntypus), Costa Rica.

Eutrypanus mucoreus (BATES, 1872) [*Astynomus*, *Astyochus*].

Distribución : México, Guatemala, Nicaragua (Bates, 1872; Bates, 1881; Blackwelder, 1946) (Chontales: Santo Domingo: Syntypus), Costa Rica, Panamá, Colombia, Venezuela.

Furona corniculata (BATES, 1885) [*Hypsioma*].

Distribución : Nicaragua (Bates, 1885; Blackwelder, 1946; Chemsak & Linsley, 1982) (Chontales: Santo Domingo: Syntypus), Panamá.

Graphisurus vexillaris (BATES, 1872) [*Astynomus*, *Astyochus*].

Distribución : México, Guatemala, Nicaragua (Bates, 1872; Bates, 1881; Blackwelder, 1946) (Chontales: Santo Domingo: Syntypus), Costa Rica, Panamá.

Hamatastus fasciatus GILMOUR, 1957.

Distribución : Nicaragua (Gilmour, 1957; Monné, 1978; Chemsak & Linsley, 1982) (Chontales: Santo Domingo: Syntypus).

Hesychotypa heraldica (BATES, 1872) [*Ischiocentra*, *Tybalma*].

= *Ischiocentra maculosa* BATES 1880 (parte).

Distribución : Nicaragua (Bates, 1872; Bates, 1880; Blackwelder, 1946;
Chemsak & Linsley, 1982) (Chontales: Santo Domingo: Syntypus).

Heschotypa turbida (BATES, 1880) [*Tybalma*].

= *Ischiocentra maculosa* BATES 1880 (parte).

Distribución : Nicaragua (Bates, 1880; Blackwelder, 1946; Chemsak &
Linsley, 1982) (Chontales: Santo Domingo: Syntypus).

Hippopsis lemniscata FABRICIUS, 1801.

= *Hippopsis lineolata*; BATES 1872 nec SERVILLE.

Distribución : USA, México, Guatemala, Nicaragua (Bates, 1872; Bates,
1880; Blackwelder, 1946; Duffy, 1960) (Chontales, Matagalpa,
Solentiname).

Xilófago : Asteraceae : *Erechtites*, *Ageratum*, *Ambrosia*.

Pedaliaceae : *Sesamum*.

Hippopsis sp.

Distribución : Nicaragua (León).

Hoplistocerus gemmatus BATES, 1874.

Distribución : Nicaragua (Bates, 1874; Bates, 1880; Blackwelder, 1946;
Chemsak & Linsley, 1982) (Chontales: Santo Domingo: Syntypus),
Costa Rica, Panamá.

Hylettus coenobita (ERICHSON, 1847) [*Leipopus*].

Distribución : Nicaragua (Bates, 1872; Bates, 1881; Blackwelder, 1946;
Chemsak & Linsley, 1982) (Chontales), Costa Rica, Panamá, Brasil,
Perú.

Hyperplatys argus BATES, 1872 [*Anisopodus*].

Distribución : Nicaragua (Bates, 1872; Bates, 1881; Blackwelder, 1946;
Chemsak & Linsley, 1982) (Chontales: Santo Domingo: Syntypus),
Costa Rica, Panamá.

Hyperplatys pusillus nigrisparsa BATES, 1885. [*Anisopodus*].

Distribución : México, Guatemala, Nicaragua (Bates, 1872; Bates, 1881;
Blackwelder, 1946) (Chontales: Santo Domingo: Syntypus),
Costa Rica, Panamá.

Isomerida lineata BATES, 1874.

= *Isomerida albicollis*; BATES 1872 (Nicaragua: Chontales: Santo
Domingo).

Distribución : Nicaragua (Bates, 1872; Bates, 1874; Bates, 1881;
Blackwelder, 1946; Chemsak & Linsley, 1982) (Chontales: Santo
Domingo: Syntypus), Costa Rica, Panamá, Colombia.

Itumbiara picticornis (BATES, 1872) [*Isomerida*].

Distribución : Nicaragua (Bates, 1872; Bates, 1881; Blackwelder, 1946; Chemsak & Linsley, 1982) (Chontales: Santo Domingo: Syntypus), Costa Rica, Panamá.

Itumbiara subdilatata (BATES, 1872) [*Isomerida*].

Distribución : Nicaragua (Bates, 1872; Bates, 1881; Blackwelder, 1946; Chemsak & Linsley, 1982) (Chontales: Santo Domingo: Syntypus), Costa Rica, Panamá.

Jamesia multivittata BATES, 1869.

Distribución : Nicaragua (Bates, 1869; Bates, 1872; Bates, 1880; Blackwelder, 1946; Chemsak & Linsley, 1982) (Chontales: Santo Domingo: Syntypus), Costa Rica, Panamá.

Jamesia papulenta THOMSON, 1868.

Distribución : Nicaragua (Bates, 1872; Bates, 1880; Blackwelder, 1946; Chemsak & Linsley, 1982) (Chontales), Costa Rica, Panamá, Colombia*.

Lagocheirus araneiformis ypsilon VOET, 1778.

Distribución : Asia, Hawaii, USA, Cuba, Jamaica, Hispaniola, Puerto Rico, Vírgenes, Leewards, Antigua, Guadalupe, St. Vincent, Granada, México, Belize, Guatemala, Honduras, Nicaragua (Bates, 1872; Bates, 1880; Blackwelder, 1946; Duffy, 1960; Maes & Tóllez, 1988) (Managua, Chinandega, León), Costa Rica, Panamá, Colombia, Venezuela, Guiana, Guiana francesa, Brasil, Ecuador, Bolivia, Argentina.

Xilófago : Anacardiaceae : *Spondias*.

Burseraceae : *Bursera*.

Euphorbiaceae : *Manihot*, *Hura*, *Sapium*.

Moraceae : *Ficus*.

Poaceae : *Saccharum*, *Zea*.

Enemigos naturales :

COL. Elateridae : *Chalcolepidius silbermanni*.

Lagocheirus cristulatus BATES, 1872.

Distribución : Nicaragua (Bates, 1872; Bates, 1880; Blackwelder, 1946; Chemsak & Linsley, 1982) (Chontales: Santo Domingo: Syntypus), Costa Rica.

Lagocheirus praecellens BATES, 1872.

Distribución : Nicaragua (Bates, 1872; Bates, 1880; Blackwelder, 1946; Chemsak & Linsley, 1982) (Chontales: Santo Domingo: Syntypus), Costa Rica, Panamá.

Lagocheirus rosaceus BATES, 1869.

= *Lagocheirus flavolineatus* AURIVILLIUS 1921.

Distribución : Nicaragua (Bates, 1869; Bates, 1880; Blackwelder, 1946)
(Chontales: Santo Domingo: Syntypus), Costa Rica, Panamá.

Lagocheirus simplicicornis BATES, 1872.

Distribución : Nicaragua (Bates, 1872; Bates, 1880; Blackwelder, 1946)
(Chontales: Santo Domingo: Syntypus), Costa Rica.

Lagocheirus tuberculatus v-album BATES, 1885.

= *Lagocheirus binumeratus*; BATES 1872 nec THOMSON (Nicaragua:
Chontales: Santo Domingo).

Distribución : Guatemala, Belize, Nicaragua (Bates, 1872; Bates, 1880;
Bates, 1885; Blackwelder, 1946; Duffy, 1960; Chemsak & Linsley,
1982) (Chontales: Santo Domingo: Syntypus), Costa Rica, Panamá.

Xilófago : Clusiaceae : *Symphonia*.

Myristicaceae : *Virola*.

Lagocheirus undatus undatus (VOET 1778).

tuetano de la yuca.

= *Lagocheirus obsoletus* THOMSON 1860.

= *Lagocheirus longipennis* BATES 1880.

Distribución : Asia, Hawái, Cuba, México, Guatemala, Belize, Nicaragua
(Bates, 1874; Bates, 1880; Blackwelder, 1946; Duffy, 1960;
Chemsak & Linsley, 1982; King & Saunders, 1984; Maes & Téllez,
1988) (Syntypus; Chontales, León, Managua, Masaya), Costa
Rica.

Xilófago : Apocynaceae : *Plumeria*, *Allamanda*.

Araucariaceae : *Araucaria*.

Euphorbiaceae : *Aleurites*, *Euphorbia*, *Manihot*, *Jatropha*.

Malvaceae : *Hibiscus*, *Gossypium*.

Solanaceae : *Capsicum*.

? : *Pseudopanax*.

Leptostylus cineraceus BATES, 1874.

Distribución : Guatemala, Nicaragua (Bates, 1874; Bates, 1880;
Blackwelder, 1946; Chemsak & Linsley, 1982) (Chontales: Santo
Domingo: Syntypus), Costa Rica.

Leptostylus corpulentus BATES, 1880.

Distribución : Nicaragua (Bates, 1880; Blackwelder, 1946; Chemsak &
Linsley, 1982) (Chontales: Santo Domingo: Syntypus).

Leptostylus cretatellus BATES, 1863.

Distribución : México, Nicaragua (Bates, 1872; Bates, 1880; Blackwelder,
1946; Chemsak & Linsley, 1982) (Chontales), Brasil.

***Leptostylus cristulatus* BATES, 1872.**

Distribución : Nicaragua (Bates, 1872; Bates, 1880; Blackwelder, 1946; Chemsak & Linsley, 1982) (Chontales: Santo Domingo: Syntypus), Costa Rica.

***Leptostylus decipiens* BATES, 1880.**

= *Leptostylus transversus*; BATES 1872 (Nicaragua: Chontales: Santo Domingo).

Distribución : Nicaragua (Bates, 1872; Bates, 1880; Blackwelder, 1946; Chemsak & Linsley, 1982) (Chontales: Santo Domingo: Syntypus), Costa Rica, Panamá.

***Leptostylus gibbulosus gibbulosus* BATES, 1874.**

Distribución : Guatemala, Nicaragua (Bates, 1874; Bates, 1880; Blackwelder, 1946; Maes & Téllez, 1988) (Chontales: Managua), Costa Rica, Panamá, Venezuela.

Fitófago : Sapindaceae (semillas).

***Leptostylus hiliaris* BATES, 1872.**

Distribución : México, Nicaragua (Bates, 1872; Bates, 1880; Blackwelder, 1946) (Chontales: Santo Domingo: Syntypus), Costa Rica, Panamá.

***Leptostylus hispidulus* BATES, 1874.**

Distribución : México, Guatemala, Nicaragua (Bates, 1874; Bates, 1880; Blackwelder, 1946) (Chontales: Santo Domingo: Syntypus), Costa Rica.

***Leptostylus incertus* (BATES, 1881) [*Oedopeza*].**

Distribución : Guatemala, Nicaragua (Bates, 1881; Blackwelder, 1946; Chemsak & Linsley, 1982) (Chontales: Santo Domingo: Syntypus).

***Leptostylus leucopygus* BATES, 1872.**

Distribución : Nicaragua (Bates, 1872; Bates, 1880; Blackwelder, 1946) (Chontales: Santo Domingo: Syntypus), Costa Rica, Panamá.

***Leptostylus macrostigma* BATES, 1872.**

Distribución : Nicaragua (Bates, 1872; Bates, 1880; Blackwelder, 1946; Chemsak & Linsley, 1982) (Chontales: Santo Domingo: Syntypus), Costa Rica, Panamá.

***Leptostylus notaticollis* BATES, 1880.**

Distribución : Nicaragua (Bates, 1880; Blackwelder, 1946; Chemsak & Linsley, 1982) (Chontales: Santo Domingo: Syntypus), Costa Rica.

***Leptostylus obliquatus* BATES, 1880.**

Distribución : México, Nicaragua (Bates, 1885; Blackwelder, 1946; Chemsak & Linsley, 1982).

Leptostylus orbiculus BATES, 1880.

Distribución : México, Nicaragua (Bates, 1880; Blackwelder, 1946; Chemsak & Linsley, 1982) (Chontales: Santo Domingo: Syntypus).

Leptostylus palliatus BATES, 1874.

Distribución : México, Nicaragua (Bates, 1874; Bates, 1880; Blackwelder, 1946; Chemsak & Linsley, 1982) (Chontales: Santo Domingo: Syntypus).

Leptostylus pygialis BATES, 1872.

Distribución : México, Nicaragua (Bates, 1872; Bates, 1880; Blackwelder, 1946; Chemsak & Linsley, 1982) (Chontales: Santo Domingo: Syntypus), Costa Rica, Panamá.

Leptostylus spermornatus CHEVROLAT.

Distribución : Nicaragua (reporte nuevo) (León).

Leptostylus spiculatus BATES, 1880.

Distribución : Nicaragua (Bates, 1880; Blackwelder, 1946; Chemsak & Linsley, 1982) (Syntypus), Costa Rica.

Leptostylus subfurcatus BATES, 1880.

Distribución : Nicaragua (Bates, 1880; Blackwelder, 1946; Chemsak & Linsley, 1982) (Chontales: Santo Domingo: Syntypus), Costa Rica, Panamá.

Leptostylus triangulifer BATES, 1872.

Distribución : México, Nicaragua (Bates, 1872; Bates, 1880; Blackwelder, 1946; Chemsak & Linsley, 1982) (Chontales: Santo Domingo: Syntypus), Costa Rica.

Leptostylus viridescens BATES, 1880.

Distribución : México, Nicaragua (Bates, 1880; Blackwelder, 1946; Chemsak & Linsley, 1982) (Syntypus), Costa Rica.

Leptostylus viriditinctus BATES, 1872.

Distribución : Nicaragua (Bates, 1872; Bates, 1880; Blackwelder, 1946; Chemsak & Linsley, 1982) (Chontales: Santo Domingo: Syntypus), Costa Rica, Panamá.

Leptostylus xanthopygus BATES, 1880.

Distribución : Nicaragua (Bates, 1880; Blackwelder, 1946; Chemsak & Linsley, 1982) (Chontales: Santo Domingo: Syntypus).

Leptostylus x-griseus BATES, 1885.

Distribución : Guatemala*, Nicaragua (Chemsak & Linsley, 1982), Costa Rica.

Leptostylus sp.

Distribución : Nicaragua (Maes & Téllez, 1988) (León).

Fitófago : Rubiaceae : *Coffea*.

Lepturges festiva BATES, 1872.

Distribución : Nicaragua (Bates, 1872; Bates, 1881; Blackwelder, 1946; Chemsak & Linsley, 1982) (Chontales: Santo Domingo: Syntypus), Costa Rica, Panamá.

Lepturges gratiosa BATES, 1874.

Distribución : Nicaragua (Bates, 1874; Bates, 1881; Blackwelder, 1946; Chemsak & Linsley, 1982) (Chontales: Santo Domingo: Syntypus), Costa Rica, Panamá.

Lepturges infilata BATES, 1872.

Distribución : USA, México, Guatemala, Nicaragua (Bates, 1872; Bates, 1881; Blackwelder, 1946) (Chontales: Santo Domingo: Syntypus), Costa Rica.

Lepturges inscripta BATES, 1863.

= *Lepturges fragillimus*; BATES 1873.

Distribución : México, Guatemala, Nicaragua (Bates, 1872; Bates, 1874; Bates, 1881; Blackwelder, 1946) (Chontales), Panamá, Brasil*.

Lepturges limpida BATES, 1872.

Distribución : México, Guatemala, Nicaragua (Bates, 1872; Bates, 1881; Blackwelder, 1946; Chemsak & Linsley, 1982) (Chontales: Santo Domingo: Syntypus), Costa Rica, Panamá.

Lepturges navicularis BATES, 1872.

Distribución : México, Nicaragua (Bates, 1872; Bates, 1881; Bates, 1885; Blackwelder, 1946) (Chontales: Santo Domingo: Syntypus), Costa Rica, Panamá.

Lepturges sexvittata BATES, 1874.

Distribución : Nicaragua (Bates, 1874; Bates, 1881; Blackwelder, 1946; Chemsak & Linsley, 1982) (Chontales: Santo Domingo: Syntypus), Costa Rica, Panamá.

Lepturges sp.

Distribución : Nicaragua (Boaco, Managua).

Lepturginus tigrellus (BATES, 1874) [*Lepturges*].

Distribución : Belize, Guatemala, Nicaragua (Bates, 1874; Bates, 1881; Blackwelder, 1946; Chemsak & Linsley, 1982) (Chontales: Santo Domingo: Syntypus).

Lepturginus tigrellus megaspilus BATES, 1885.

Distribución : Guatemala*, Nicaragua (Chemsak & Linsley, 1982).

Lochmaeocles batesi (AURIVILLIUS, 1923) [*Oncideres*].

= *Oncideres callidryas*; BATES 1872 nec BATES (Nicaragua: Chontales: Santo Domingo).

= *Oncideres callidryas* var.; BATES 1880 (Nicaragua: Chontales: Santo Domingo).

Distribución : Nicaragua (Bates, 1880; Aurivillius, 1923, Blackwelder, 1946) (Chontales: Santo Domingo: Syntypus), Costa Rica, Panamá.

Lochmaeocles sparsus (BATES, 1880) [*Oncideres*].

Distribución : México*, Nicaragua (Bates, 1880; Blackwelder, 1946; Maes & Téllez, 1988) (Chontales: Santo Domingo: Syntypus), Costa Rica, Panamá.

Fitófago : Rubiaceae : *Coffea*.

Lochmaeocles tessellatus costaricae CHEMSAK, 1986.

Distribución : Nicaragua (Chemsak, 1986) (Managua), Costa Rica*.

Xilófago : Mimosaceae : *Enterolobium*, *Pithecelobium*.

Lophopoeum saronotum BATES, 1872.

Distribución : Nicaragua (Bates, 1872; Bates, 1881; Bates, 1885; Blackwelder, 1946; Chemsak & Linsley, 1982) (Chontales: Santo Domingo: Syntypus), Costa Rica, Panamá.

Lophopoeum scopiferum BATES, 1872.

Distribución : México, Guatemala, Belize, Nicaragua (Bates, 1872; Bates, 1881; Blackwelder, 1946; Chemsak & Linsley, 1982) (Chontales: Santo Domingo: Syntypus).

Lycidola belti BATES, 1872.

Distribución : Nicaragua (Bates, 1872; Bates, 1881; Blackwelder, 1946; Chemsak & Linsley, 1982) (Chontales: Santo Domingo: Syntypus).

Macronemus asperulus (WHITE, 1855) [*Aethomerus*].

= *Aethomerus antennator*; BATES, 1872 nec FABRICIUS.

Distribución : México, Guatemala, Nicaragua (Bates, 1872; Bates, 1880; Blackwelder, 1946) (Chontales), Costa Rica, Panamá, Venezuela*.

Mecotetartus antennatus BATES, 1872.

= *Eutessus asper* LECONTE 1873.

Distribución : México, Nicaragua (Bates, 1872; Bates, 1881; Blackwelder, 1946) (Chontales: Santo Domingo: Syntypus; Managua), Costa Rica.

Myoxinus asper BATES, 1880.

Distribución : México*, Nicaragua (Bates, 1880; Blackwelder, 1946; Chemsak & Linsley, 1982) (Chontales: Santo Domingo: Syntypus).

Myoxinus pictus ERICHSON, 1847.

Distribución : México, Guatemala, Nicaragua (Bates, 1872; Bates, 1880; Blackwelder, 1946) (Chontales), Panamá, Brasil, Perú*.

Nealcidion brachiale (BATES, 1872) [*Alcidion*].

Distribución : México, Guatemala, Nicaragua (Bates, 1872; Bates, 1874; Bates, 1881; Blackwelder, 1946) (Chontales: Santo Domingo: Syntypus), Costa Rica, Panamá.

Nealcidion privatum penicillare (BATES, 1885) [*Alcidion*].

= *Alcidion penicillatum* AURIVILLIUS 1923.

Distribución : Guatemala*, Nicaragua (Bates, 1872; Bates, 1881; Bates, 1885; Blackwelder, 1946; Duffy, 1960; Chemsak & Linsley, 1982) (Chontales: Santo Domingo: Syntypus), Costa Rica.

Xilófago : Cactaceae : *Cereus*.

Neoptychodes cretatus (BATES, 1872) [*Ptychodes*].

Distribución : Nicaragua (Bates, 1872; Bates, 1881; Blackwelder, 1946; Chemsak & Linsley, 1982) (Chontales: Santo Domingo: Syntypus; Managua), Costa Rica, Panamá.

Neoptychodes trilineatus (LINNAEUS, 1771) [*Cerambyx*, *Ptychodes*].

= *Saperda vittata* FABRICIUS 1776.

= *Ptychodes fairmairei* THOMSON (Nicaragua: Syntypus).

Distribución : Tahiti, USA, Cuba, Jamaica, Puerto Rico, México, Belize, Guatemala, Honduras, Nicaragua (Bates, 1872; Bates, 1880; Blackwelder, 1946; Duffy, 1960; Maes & Téllez, 1988) (Chinandega, Chontales, Managua, Carazo), Costa Rica, Panamá, Colombia, Venezuela, Trinidad, Guiana, Surinam.

Xilófago : Anacardiaceae : *Spondias*.

Betulaceae : *Alnus*.

Fabaceae : *Inocarpus*.

Moraceae : *Ficus*, *Morus*, *Chlorophora*.

Rubiaceae : *Coffea*.

Enemigos naturales :

COL. Elateridae : *Semiotus ligneus*.

Nyssodectes roseicollis (BATES, 1872) [*Nyssodrys*, *Lepturges*].

Distribución : México, Guatemala, Nicaragua (Bates, 1872; Bates, 1881; Blackwelder, 1946) (Chontales: Santo Domingo: Syntypus), Costa Rica, Panamá.

Nyssodrysina binoculata (BATES, 1864) [*Nyssodrys*, *Nyssodrystes*].

= *Nyssodrys bimaculata* AURIVILLIUS 1923.

Distribución : Nicaragua (Bates, 1881; Blackwelder, 1946; Chemsak & Linsley, 1982) (Chontales), Costa Rica, Panamá, Brasil*.

Nyssodrysina haldemani (LECONTE, 1852) [*Nyssodrys*].

= *Nyssodrys contempta* BATES 1864.

Distribución : USA, México, Belize, Guatemala, Nicaragua (Bates, 1872; Bates, 1881; Blackwelder, 1946) (Chontales, León, Managua), Costa Rica, Panamá.

Nyssodrysina leucopyga (BATES, 1872) [*Nyssodrys*, *Nyssodrystes*].

Distribución : México, Nicaragua (Bates, 1872; Bates, 1881; Blackwelder, 1946; Chemsak & Linsley, 1982) (Chontales: Santo Domingo: Syntypus), Costa Rica, Panamá.

Nyssodrysina venusta (BATES, 1863) [*Lepturges*, *Nyssodrys*, *Nyssodrystes*].

Distribución : Nicaragua (Bates, 1880; Blackwelder, 1946; Chemsak & Linsley, 1982) (Chontales), Brasil*.

Nyssodrysternum ocellatum (BATES, 1885) [*Nyssodrys*].

Distribución : México, Nicaragua (Bates, 1872; Bates, 1881; Bates, 1885; Blackwelder, 1946) (Chontales: Santo Domingo: Syntypus), Costa Rica, Panamá, Venezuela, Guiana francesa, Brasil.

Nyssodrysternum serpentinum (ERICHSON, 1847).

= *Nyssodrys deleta* BATES, 1864.

Distribución : México, Guatemala, Nicaragua (Bates, 1872; Bates, 1881; Blackwelder, 1946; Duffy, 1960) (Chontales), Costa Rica, Panamá, Guiana francesa, Brasil*.

Xilófago : Fabaceae : *Pterocarpus*.

Oedopeza guttigera BATES, 1864.

= *Oedopeza guttifera* BATES 1881.

Distribución : México, Nicaragua (Bates, 1872; Bates, 1881; Blackwelder, 1946) (Chontales), Costa Rica, Panamá.

Oedopeza pogonocheroides SERVILLE, 1835.

Distribución : México, Belize, Guatemala, Nicaragua (Bates, 1872; Bates, 1881; Blackwelder, 1946; Duffy, 1960) (Chontales, Managua, Estelí), Costa Rica, Panamá, Guiana francesa, Brasil, Argentina.

Xilófago : Fabaceae : *Mora*.

Mimosaceae : *Pithecelobium*.

Pinaceae : *Pinus*.

? : *Saman*.

Oedopeza setiger (BATES, 1864) [*Chaetanes*].

Distribución : Nicaragua (Bates, 1872; Bates, 1881; Blackwelder, 1946; Duffy, 1960; Chemsak & Linsley, 1982) (Chontales), Costa Rica, Panamá, Guiana francesa, Brasil*, Ecuador.

Xilófago : Caesalpiniaceae : *Swartzia*.

Olenosus serrimanus BATES, 1872.

Distribución : México, Guatemala, Nicaragua (Bates, 1872; Bates, 1881; Blackwelder, 1946) (Chontales: Santo Domingo: Syntypus), Costa Rica.

Oncideres albomarginata albomarginata THOMSON, 1868.

Distribución : México, Nicaragua (Bates, 1872; Bates, 1880; Blackwelder, 1946; Duffy, 1960; Maes & Téllez, 1988) (Chontales, Managua), Costa Rica, Panamá, Venezuela, Guiana, Guiana francesa.

Xilófago : Rubiaceae : *Coffea*.

? : *Cola*.

Oncideres fulvostillata BATES, 1872.

Distribución : Nicaragua (Bates, 1872; Bates, 1880; Blackwelder, 1946) (Chontales: Santo Domingo: Syntypus), Costa Rica, Panamá.

Oncideres ocellaris BATES, 1885.

Distribución : México, Guatemala, Honduras, Nicaragua (Dillon & Dillon, 1946) (Matagalpa).

Oncideres punctata DILLON & DILLON, 1946.

Distribución : Nicaragua (Dillon & Dillon, 1946; Chemsak & Linsley, 1982) (?Ameyá: Syntypus), Costa Rica.

Oncideres senilis BATES, 1885.

Distribución : México, Nicaragua (Bates, 1885; Blackwelder, 1946; Chemsak & Linsley, 1982) (Chontales: Santo Domingo: Syntypus).

Oncideres sp.

Distribución : Nicaragua (Maes & Téllez, 1988; Maes, 1992) (Zelaya, Carazo).

Xilófago : Mimosaceae : *Pithecellobium*.

Oreodera c-album BATES, 1872.

Distribución : Nicaragua (Bates, 1872; Bates, 1880; Blackwelder, 1946; Chemsak & Linsley, 1982) (Chontales: Santo Domingo: Syntypus), Costa Rica.

Oreodera canotogata BATES, 1872.

Distribución : Nicaragua (Bates, 1872; Bates, 1880; Blackwelder, 1946; Chemsak & Linsley, 1982) (Chontales: Santo Domingo: Syntypus), Costa Rica, Panamá.

Oreodera costaricensis THOMSON, 1865.

Distribución : Nicaragua (Bates, 1872; Bates, 1880; Blackwelder, 1946; Chemsak & Linsley, 1982) (Chontales), Costa Rica*, Panamá.

Oreodera fasciculosa THOMSON, 1865.

= *Oreodera hispida* BATES 1880.

Distribución : México*, Belize, Guatemala, Nicaragua (Bates, 1885; Blackwelder, 1946; Chemsak & Linsley, 1982) (Chontales), Costa Rica, Panamá.

Oreodera glauca glauca (LINNAEUS, 1758) [*Cerambyx*, *Lamia*].

= *Oreodera scabra* FABRICIUS 1792.

= *Oreodera rudis* FABRICIUS 1792.

= *Oreodera literata* DONOVAN 1813.

= *Oreodera punctata* VOET 1778.

= *Lamia spengleri* FABRICIUS 1776.

= *Oreodera tuberculata* DEGEER 1775.

Distribución : Bahamas, Jamaica, Hispaniola, Puerto Rico, Guadalupe, Sta. Lucia, Dominica, México, Guatemala, Nicaragua (Bates, 1872; Bates, 1880; Blackwelder, 1946; Duffy, 1960) (Chontales), Panamá, Venezuela, Guiana, Brasil, Argentina.

Xilófago : Fabaceae : *Pterocarpus*.

Moraceae : *Ficus*.

Oreodera granulifera BATES, 1872.

Distribución : Nicaragua (Bates, 1872; Bates, 1880; Blackwelder, 1946; Chemsak & Linsley, 1982) (Chontales: Santo Domingo: Syntypus), Costa Rica, Panamá.

Oreodera inscripta BATES, 1872.

= *Oreodera inscriptipennis* BATES 1880 (Nicaragua: Chontales: Santo Domingo).

Distribución : Nicaragua (Bates, 1872; Bates, 1880; Blackwelder, 1946; Chemsak & Linsley, 1982) (Chontales: Santo Domingo: Syntypus), Costa Rica, Panamá.

Oreodera obsoleta BATES, 1874.

Distribución : México, Guatemala, Nicaragua (Bates, 1874; Bates, 1880; Blackwelder, 1946; Chemsak & Linsley, 1982) (Chontales: Santo Domingo: Syntypus).

Oreodera semialba BATES, 1874.

Distribución : Nicaragua (Bates, 1874; Bates, 1880; Blackwelder, 1946; Chemsak & Linsley, 1982) (Chontales: Santo Domingo: Syntypus), Costa Rica, Panamá.

Oreodera verrucosa BATES, 1872.

Distribución : Nicaragua (Bates, 1872; Bates, 1880; Blackwelder, 1946; Chemsak & Linsley, 1982) (Chontales: Santo Domingo: Syntypus), Costa Rica, Panamá.

Ozineus arietinus BATES, 1872.

Distribución : México, Guatemala, Nicaragua (Bates, 1872; Bates, 1881; Blackwelder, 1946; Duffy, 1960) (Chontales: Santo Domingo: Syntypus), Costa Rica, Panamá.

Xilófago : ? : Entanda.

Parmenonta valida THOMSON, 1868 [*Adetus*].

Distribución : México*, Guatemala, Belize, Nicaragua (Bates, 1872; Bates, 1880; Blackwelder, 1946; Chemsak & Linsley, 1982) (Chontales).

Phaea miniata PASCOE, 1858.

= *Phaea lineola* BATES 1872 (Nicaragua: Chontales: Santo Domingo: Syntypus).

Distribución : México, Nicaragua (Bates, 1872; Bates, 1881; Blackwelder, 1946; Chemsak, 1977) (Chontales), Costa Rica, Venezuela*.

Phaea mirabilis BATES, 1873.

Distribución : Nicaragua (Bates, 1873; Bates, 1881; Blackwelder, 1946; Chemsak & Linsley, 1982) (Chontales: Santo Domingo: Syntypus), Costa Rica.

Phaea scuticollis BATES, 1872.

Distribución : Nicaragua (Bates, 1872; Bates, 1881; Blackwelder, 1946; Chemsak & Linsley, 1982) (Chontales: Santo Domingo: Syntypus), Costa Rica.

Phoebe albaria (BATES, 1872) [*Amphionycha*].

Distribución : Nicaragua (Bates, 1872; Bates, 1881; Blackwelder, 1946; Chemsak & Linsley, 1982) (Chontales: Santo Domingo: Syntypus), Costa Rica.

Phoebe mexicana BATES, 1881.

Distribución : México*, Nicaragua (reporte nuevo) (León).

Phrissolaus inspersus BATES, 1881.

Distribución : Nicaragua (Bates, 1881; Blackwelder, 1946; Chemsak & Linsley, 1982) (Chontales: Santo Domingo: Syntypus), Costa Rica, Panamá.

Plagiohammus elatus (BATES, 1872) [*Hammoderus*].

Distribución : Nicaragua (Bates, 1872; Bates, 1880; Blackwelder, 1946) (Chontales: Santo Domingo: Syntypus), Costa Rica, Panamá.

Plagiohammus inermis (THOMSON, 1857) [*Taeniotes*, *Hammoderus*].

= *Taeniotes albiplagiatus* WHITE 1858.

Distribución : México*, Nicaragua (Bates, 1872; Bates, 1880; Blackwelder, 1946; Chemsak & Linsley, 1982) (Chontales).

Plagiohammus maculosus (BATES, 1880) [*Hammoderus*].

Distribución : Belize, Guatemala, El Salvador, Nicaragua (Bates, 1880; Blackwelder, 1946) (Chontales: Santo Domingo: Syntypus).

Plagiohammus nitidus (BATES, 1874) [*Hammoderus*].

Distribución : Nicaragua (Bates, 1874; Bates, 1880; Blackwelder, 1946; Chemsak & Linsley, 1982) (Chontales: Santo Domingo: Syntypus).

Plagiohammus rubefactus (BATES, 1872) [*Hammoderus*].

Distribución : México, Nicaragua (Bates, 1872; Bates, 1880; Blackwelder, 1946; Chemsak & Linsley, 1982) (Chontales: Santo Domingo: Syntypus), Costa Rica, Panamá.

Plagiohammus spinipennis (THOMSON, 1860) [*Hammoderus*].

Distribución : México*, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua (Bates, 1872; Bates, 1880; Blackwelder, 1946) (Chontales), Costa Rica, Panamá, Colombia, Venezuela, Perú.

Xilófago : Verbenaceae : *Lantana*.

Polyrhaphis angustata BUQUET, 1853.

= *Polyrhaphis elongata* BATES 1880.

Distribución : Nicaragua (Bates, 1872; Bates, 1880; Blackwelder, 1946; Duffy, 1960; Chemsak & Linsley, 1982) (Chontales), Costa Rica, Panamá, Guayana francesa, Ecuador, Brasil.

Xilófago : bejuco desconocido.

Polyrhaphis n. sp. cerca de *fabricii* THOMSON, 1865.

= *Polyrhaphis fabricii* BATES 1872 nec THOMSON.

Distribución : Nicaragua (Bates, 1872; Belt, 1874; Bates, 1880; Blackwelder, 1946; Chemsak & Linsley, 1982) (Chontales), Costa Rica, Panamá.

Polyrhaphis paraensis BATES, 1862.

Distribución : Nicaragua (Bates, 1872; Bates, 1880; Blackwelder, 1946) (Chontales), Costa Rica, Panamá, Venezuela, Brasil*.

Priscilla hypsiomoides THOMSON, 1864.

= *Colobothra dioptica* BATES 1865.

Distribución : Nicaragua (Bates, 1872; Bates, 1881; Blackwelder, 1946; Chemsak & Linsley, 1982) (Chontales), Costa Rica, Panamá, Guiana francesa*, Brasil.

Ptychodes politus SERVILE, 1835.

= *Taeniotes lineata* NEWMAN 1838.

= *Ptychodes lecontei* THOMSON 1856.

Distribución : México*, Belize, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua (Bates, 1872; Bates, 1880; Blackwelder, 1946) (Chontales, Jinotega, Boaco, Estelí), Costa Rica, Panamá, Colombia.

Ptychodes taeniotoides niveisparsa BATES, 1872.

Distribución : México, Nicaragua (Maes & Téllez, 1988) (Granada, Managua, Ometepe), Panamá*.

Fitófago : Rubiaceae : *Coffea*.

Pycnomorphus centrolineatus BATES, 1862 [*Alphus*].

Distribución : Nicaragua (Bates, 1872; Bates, 1880; Blackwelder, 1946) (Chontales), Costa Rica, Panamá, Venezuela, Brasil*.

Sangaris geometrica (BATES, 1872) [*Synchyzopus*, *Carterica*].

Distribución : Nicaragua (Bates, 1872; Bates, 1881; Blackwelder, 1946; Chemsak & Linsley, 1982) (Chontales: Santo Domingo: Syntypus), Costa Rica.

Steirastoma albiceps BATES, 1872.

Distribución : Nicaragua (Bates, 1872; Bates, 1880; Blackwelder, 1946; Chemsak & Linsley, 1982) (Chontales: Santo Domingo: Syntypus), Costa Rica, Panamá.

Steirastoma histrionica histrionica WHITE, 1855.

Distribución : Jamaica, Puerto Rico, México, Belize*, Guatemala, Nicaragua (Bates, 1872; Bates, 1880; Bates, 1885; Blackwelder, 1946) (Chontales), Costa Rica.

Steirastoma melanogenys WHITE, 1855.

Distribución : México, Nicaragua (Bates, 1872; Bates, 1880; Blackwelder, 1946; Chemsak & Linsley, 1982) (Chontales), Costa Rica, Panamá, Guiana francesa, Brasil*.

Steirastoma senex WHITE, 1855.

Distribución : México*, Guatemala, Nicaragua (Bates, 1872; Bates, 1880; Blackwelder, 1946) (Chontales), Costa Rica, Panamá.

Stenolis calligramma calligramma (BATES, 1872) [*Lepturges*, *Nyssodrys*, *Nyssodrystes*].

Distribución : México, Guatemala, Nicaragua (Bates, 1872; Bates, 1881; Blackwelder, 1946; Chemsak & Linsley, 1982) (Chontales: Santo Domingo: Syntypus), Costa Rica, Panamá.

Stenolis circumscripta BATES, 1881 [*Lepturges*, *Nyssodrys*, *Nyssodrystes*].

Distribución : Nicaragua (Bates, 1881; Blackwelder, 1946; Chemsak & Linsley, 1982) (Chontales: Santo Domingo: Syntypus), Costa Rica, Panamá.

Stenolis decemguttata (BATES, 1885) [*Nyssodrys*, *Nyssodrystes*].

= *Nyssodrys calligramma* var.; BATES 1881.

Distribución : Nicaragua (Bates, 1881; Bates, 1885; Blackwelder, 1946; Chemsak & Linsley, 1982) (Chontales: Santo Domingo: Syntypus), Costa Rica, Panamá.

Stenolis laetifica (BATES, 1872) [*Lepturges*, *Nyssodrys*, *Nyssodrystes*].

Distribución : Nicaragua (Bates, 1872; Bates, 1881; Blackwelder, 1946; Chemsak & Linsley, 1982) (Chontales: Santo Domingo: Syntypus), Costa Rica, Panamá.

Stenolis polygramma (BATES, 1872) [*Nyssodrys*, *Nyssodrystes*].

Distribución : Nicaragua (Bates, 1872; Bates, 1881; Blackwelder, 1946; Chemsak & Linsley, 1982) (Chontales: Santo Domingo: Syntypus), Costa Rica, Panamá.

Sympagus laetabilis (BATES, 1872) [*Lepturges*].

Distribución : Nicaragua (Bates, 1872; Bates, 1881; Blackwelder, 1946; Chemsak & Linsley, 1982) (Chontales: Santo Domingo: Syntypus), Costa Rica, Panamá.

Taeniotes praeclarus BATES, 1872.

Distribución : Nicaragua (Bates, 1872; Belt, 1874; Bates, 1880; Blackwelder, 1946; Chemsak & Linsley, 1982) (Chontales: Santo Domingo: Syntypus), Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador.

Taeniotes scalaris (FABRICIUS) [Lamia].

= *Taeniotes scalatus* GMELIN 1790.

= *Taeniotes suturalis* THOMSON 1857.

= *Taeniotes univittatus* TASCHENBERG, 1870.

Distribución : Martinica, Granada, México, Belize, Guatemala, Honduras, Nicaragua (Bates, 1872; Bates, 1880; Blackwelder, 1946) (Chontales), Costa Rica, Panamá, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Brasil, Bolivia.

Xilófago : Moraceae : *Ficus*, *Morus*, *Artocarpus*, *Castilla*.

Rubiaceae : *Coffea*.

Taeniotes xanthostictus BATES, 1880.

= *Taeniotes luciani*; BATES 1872 nec THOMSON (Nicaragua: Chontales: Santo Domingo).

Distribución : México, Guatemala, Nicaragua (Bates, 1872; Bates, 1880; Blackwelder, 1946) (Chontales: Santo Domingo: Syntypus; Managua), Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador.

Tapeina transversifrons centralis MARINONI, 1972.

Distribución : Nicaragua (Bates, 1872; Bates, 1881; Blackwelder, 1946; Duffy, 1960) (Chontales), Costa Rica, Panamá, Venezuela.

Xilófago : Mimosaceae : *Inga*.

Taricanus truquii THOMSON, 1868.

Distribución : México, Nicaragua (Chemsak & Linsley, 1982).

Tetraopes thermophilus CHEVROLAT, 1861.

Distribución : USA, México*, Nicaragua (reporte nuevo) (Managua).

Xilófago : Apocynaceae : *Plumeria*.

Pedaliaceae : *Sesamum*.

Asclepiadaceae : *Asclepias*.

Tetraopes umbonatus LECONTE, 1852.

Distribución : México*, Nicaragua (Bates, 1873; Bates, 1874; Bates, 1881; Blackwelder, 1946; Chemsak & Linsley, 1982) (Chontales, Estelí, León).

Fitófago : Fabaceae : *Phaseolus*.

Asclepiadaceae : *Asclepias*.

Tetraopes sp.

Distribución : Nicaragua (Maes & Téllez, 1988).

Fitófago : Fabaceae : *Phaseolus*.

Pedaliaceae : *Sesamum*.

Tetraserus pictulus (BATES, 1880) [*Discopus*].

= *Discopus quadriscopulatus*; BATES 1872 (Nicaragua: Chontales: Santo Domingo).

Distribución : México, Nicaragua (Bates, 1872; Bates, 1880; Blackwelder, 1946; Chemsak & Linsley, 1982) (Chontales: Santo Domingo: Syntypus), Costa Rica.

Thryallis maculosa BATES, 1857.

Distribución : México*, Nicaragua (reporte nuevo) (Carazo).

Tithonus barbicapum (BATES, 1872) [*Lophopoeum*].

Distribución : Guatemala, Nicaragua (Bates, 1872; Bates, 1881; Blackwelder, 1946) (Chontales: Santo Domingo: Syntypus), Costa Rica, Panamá.

Trachysomus surdus DILLON & DILLON.

Distribución : Nicaragua (Nuevo reporte) (Zelaya).

Trestonia assulina BATES, 1874.

Distribución : Nicaragua (Bates, 1874; Bates, 1880; Blackwelder, 1946; Chemsak & Linsley, 1982) (Chontales: Santo Domingo: Syntypus), Panamá.

Trypanidius mexicanus THOMSON, 1860.

Distribución : México, Nicaragua (Bates, 1872; Bates, 1881; Blackwelder, 1946) (Chontales), Costa Rica, Panamá.

Trypanidius notatus (FABRICIUS, 1787).

= *Leiopus melancholicus* SERVILE 1835 [*Trypanidius*].

= *Trypanidius geminus* PASCOE 1859.

Distribución : Guatemala, Nicaragua (Bates, 1872; Bates, 1881; Blackwelder, 1946; Duffy, 1960) (Chontales), Guiana francesa*, Brasil, Ecuador.

Xilófago : Annonaceae : *Rollinia*.

Euphorbiaceae : *Alchornea*.

Rubiaceae : *Genipa*.

Enemigos naturales :

DIP. (parasitoides).

Trypanidius rubripes BATES, 1872.

Distribución : Nicaragua (Bates, 1872; Bates, 1881; Blackwelder, 1946; Chemsak & Linsley, 1982) (Chontales: Santo Domingo: Syntypus), Costa Rica, Panamá.

Tybalnia caeca BATES, 1872.

= *Tybalnia coeca* AURIVILLIUS 1923.

Distribución : Nicaragua (Bates, 1872; Bates, 1880; Blackwelder, 1946; Chemsak & Linsley, 1982) (Chontales: Santo Domingo: Syntypus), Costa Rica, Panamá.

Tyrinthia xanthe BATES, 1881.

Distribución : Nicaragua (Bates, 1881; Blackwelder, 1946; Chemsak & Linsley, 1982) (Chontales: Santo Domingo: Syntypus), Costa Rica, Panamá.

Urgleptes mixta (BATES, 1881) [*Lepturges*].

= *Lepturges musculus*; BATES 1872 nec BATES.

Distribución : México, Belize, Nicaragua (Bates, 1872; Bates, 1881; Blackwelder, 1946) (Chontales: Santo Domingo: Syntypus), Costa Rica, Panamá.

Urgleptes multinotata (BATES, 1881) [*Lepturges*].

Distribución : Guatemala, Nicaragua (Bates, 1881; Blackwelder, 1946; Chemsak & Linsley, 1982) (Chontales: Santo Domingo: Syntypus).

Urgleptes ruficollis (BATES, 1881) [*Lepturges*].

= *Lepturges unilineata* BATES 1872 (parte) (Nicaragua: Chontales: Santo Domingo).

Distribución : Nicaragua (Bates, 1872; Bates, 1881; Blackwelder, 1946; Chemsak & Linsley, 1982) (Chontales: Santo Domingo: Syntypus), Costa Rica.

Urgleptes tumidicollis (BATES, 1881) [*Lepturges*].

Distribución : Guatemala, Nicaragua (Bates, 1881; Blackwelder, 1946) (Chontales: Santo Domingo: Syntypus), Costa Rica, Panamá.

Urgleptes unilineata (BATES, 1872) [*Lepturges*].

Distribución : Nicaragua (Bates, 1872; Bates, 1881; Blackwelder, 1946; Chemsak & Linsley, 1982) (Chontales: Santo Domingo: Syntypus), Costa Rica.

AGRADECIMIENTOS

Agradecemos en estas líneas a Ubirajara J. Martins (Brasil), por su ayuda y a Dan Heffern por la identificación de algunos especímenes.

BIBLIOGRAFIA

AURIVILLIUS C. (1912) Coleopterorum Catalogus pars 39, Cerambycidae: Cerambycinae. pp.1-574.

- AURIVILLUS C.** (1923) *Coleopterorum Catalogus pars 74, Cerambycidae: Lamiinae*. pp.1-704.
- BATES H.W.** (1869) Contributions to an insect fauna of the Amazon Valley (Coleoptera, Prionides). *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1869:37-58.
- BATES H.W.** (1869) XXV. New species of Coleoptera from Chontales, Nicaragua. *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1869(V):383-389.
- BATES H.W.** (1870) Contribution to an insect fauna of the Amazon Valley (Coleoptera, Cerambycidae). *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1870:243-335, 391-444.
- BATES H.W.** (1872) IX. On the longicorn Coleoptera of Chontales, Nicaragua. *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1872(III):163-238.
- BATES H.W.** (1873) Notes on the longicorn Coleoptera of tropical America. *Ann. Mag. Nat. Hist.*, 4(11):21-45, 117-132.
- BATES H.W.** (1874) VII. Supplement to the longicorn Coleoptera of Chontales, Nicaragua. *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1874(II):219-235.
- BATES H.W.** (1879-1886) *Biologia Centrali-Americana. Insecta. Coleoptera. V*:436 pp., 25 lams.
- BELT T.** (1874) *The naturalist in Nicaragua*. London. (Reprinted in 1985 by the University of Chicago Press, 403 pp).
- BREUNING S.** (1940) *Novae species cerambycidarum*. IX. *Fol. Zool. Hydrobiol.*, 10:115-214.
- BLACKWELDER R.E.** (1946) Checklist of the coleopterous insects of México, Central America, the West Indies and South America. *Bull. U.S. Nat. Mus.*, 185(4):551-627.
- CHEMSAK J.A.** (1967) Lectotype designation of Cerambycidae in the British Museum (Natural History). *Jl. Kansas Ent. Soc.*, 40:73-81.
- CHEMSAK J.A.** (1977) Records and description of some Mexican species of the genus *Phaea* Newmann (Coleoptera: Cerambycidae). *Pan-Pac. Ent.*, 53(4):269-276.
- CHEMSAK J.A.** (1980) Revision of the genus *Stenobatyle* Casey (Coleoptera: Cerambycidae). *Pan-Pac. Ent.*, 56(2):113-120.
- CHEMSAK J.A. & LINSLEY E.G.** (1981) Additions to the know species of *Pseudotypocereus* and *Strangalia* (Coleoptera: Cerambycidae). *Pan-Pac. Ent.*, 57(4):485-491.
- CHEMSAK J.A. & LINSLEY E.G.** (1982) Checklist of the Cerambycidae and Disteniidae of North America, and the West Indies (Coleoptera). *Plexus Publ., USA*, 138 pp.
- CHEMSAK J.A.** (1983) *Acrocinus longimanus* (arlequín, harlequin beetle). En *JANZEN D.H. Costa Rican Natural History*. Univ. Chicago Press, pp.678-679.
- CHEMSAK J.A.** (1986) New Onciderini from Santa Rosa National Park, Costa Rica (Coleoptera: Cerambycidae). *Jl. N.Y. Ent. Soc.*, 94(1):16-19.
- DUFFY E.A.J.** (1960) A monograph of the immature stages of Neotropical timber beetles (Cerambycidae). *British Museum (Natural History), London*, 327 pp., 13 lams.
- GIESBERT E.F.** (1985) Additional species in the genus *Strangalia* (Coleoptera: Cerambycidae) in Central America, with a revised key to males. *Pan-Pac. Ent.*, 61(4):273-287.

- GIESBERT E.F. & CHEMSAK J.A.** (1989) The genus *Stenosphenus* Haldeman (Coleoptera: Cerambycidae). Pan-Pac. Ent., 65(3):269-301.
- KING A.B.S. & SAUNDERS J.L.** (1984) The invertebrate pests of annual food crops in Central America. TDRI, CATIE, Costa Rica, 166 pp., 64 lams.
- LAMEERE A.A.L.** (1913) Coleopterorum Catalogus pars 52, Cerambycidae: Prioninae. pp.1-108.
- MAES J.M. & TELLEZ ROBLETO J.** (1988) Catálogo de los insectos y artrópodos terrestres asociados a las principales plantas de importancia económica en Nicaragua. Rev. Nica. Ent., 5:1-95.
- MAES J.M.** (1992) Fauna entomológica del Departamento de Zelaya, Nicaragua (Segunda nota). Rev. Nica. Ent., 19:29-41.
- MARTINS U.R.** (1970) Monografia da tribo Iridionini (Coleoptera, Cerambycinae). Arqu. Zool., 16(5):1151-1342.
- NAPP D.S. & MARTINS U.R.** (1982) Subsídios para revisão taxonomica da tribo Achrysonini (Coleoptera, Cerambycidae) nas Americas. Papeis Avulsos Zool., 34(28):349-401.

Recomendaciones a los autores.

La Revista Nicaragüense de Entomología es una publicación del Servicio Entomológico Autónomo que aparece sin periodicidad fija, con un promedio de 4 números al año. Publica trabajos relacionados con el área de Entomología, principalmente de Nicaragua.

Todo artículo que se desee presentar para su publicación deberá dirigirse al editor y debe ajustarse a las normas citadas a continuación.

Normas de publicación.

Los artículos serán escritos de preferencia en idioma español pero se aceptan en otros idiomas, con resumen en español.

El original mecanografiado se presentará en papel blanco, tamaño carta (A4), a doble espacio, sin anotaciones entre líneas, con márgenes de 3 cm, numerando todas las páginas en forma consecutiva.

Los cuadros, figuras, mapas y fotografías deberán ser presentados por separado del texto, así como sus pies de ilustración o encabezados. Las ilustraciones serán de preferencia en negro y blanco; dibujos o fotos, con un buen contraste. La publicación de las ilustraciones a color serán a cuenta del autor.

El texto de un artículo de investigación original puede incluir los siguientes puntos ordenados: resumen en idioma español, abstract en inglés, introducción o antecedentes, materiales y métodos, resultados, discusión o análisis, comentarios o conclusiones, agradecimientos y literatura citada o bibliografía.

El resumen y el abstract no deben de contener más de 10 líneas cada uno.

Todo trabajo de tipo taxonómico deberá atender a las reglas del Código Internacional de Nomenclatura Zoológica.

Costos de publicación y sobretiros.

La publicación de un artículo es completamente gratis, a la excepción de las ilustraciones a color que están completamente a cuenta del autor.

Cada autor recibirá 10 separatas de su publicación. Las separatas suplementarias serán pagadas a precio de costo.

CONTENIDO DEL NUMERO 27.

MAES J.M., ALLEN A., MONNE M.A. & HOVORE F.T. - Catálogo de los Cerambycidae (Coleoptera) de Nicaragua. pp.1-58.

