

EPIPHILE OREA SSP. PLUSIOS
GODMAN & SALVIN
(LEPIDOPTERA: NYMPHALIDAE)
NUEVO REPORTE PARA NICARAGUA.

Por Jean-Michel MAES. *

ABSTRACT

Epiphile oreæ ssp. plusios Godman & Salvin, 1883 (Lepidoptera: Nymphalidae) is reported for first time from Nicaragua. A list and key of the known species of *Epiphile* in Nicaragua is also given.

RESUMEN

Epiphile oreæ ssp. plusios Godman & Salvin, 1883 (Lepidoptera: Nymphalidae) es reportada por primera vez de Nicaragua. Una lista y una clave de las especies de *Epiphile* presentes en Nicaragua son presentadas.

* Museo Entomológico, S.E.A., A.P. 527, León, Nicaragua.

Epiphile oreia ssp. plusios GODMAN & SALVIN, 1883.



Figuras : macho y hembra de *Epiphile oreia ssp. plusios* GODMAN & SALVIN.

La especie *Epiphile oreia* HUBNER es conocida desde Costa Rica hasta Argentina. Se reporta por primera vez de Nicaragua, lo que aumenta un poco al norte la distribución de esta especie.

Los gusanos de la especie *Epiphile oreia* viven sobre plantas de la familia Sapindaceae perteneciendo a los géneros *Serjania* y *Paullinia*.

Las especies del género *Epiphile* viven en bosque de montaña, arriba de 500 metros.

La especie *Epiphile oreia* HUBNER presenta en su área de distribución cuatro subespecies :

- *ssp. plusios* GODMAN & SALVIN, distribuida en Costa Rica y Panamá. A esta subespecie se agrega Nicaragua.

El espécimen sobre el cual se basa el presente reporte es una hembra colectada en Fuente Pura, sobre la carretera entre Matagalpa y Jinotega, en el Departamento de Matagalpa. Altura 1500 metros. El espécimen fue colectado el 9 de junio por Jean-Michel Maes, Pierre Jolivet y Johnson Hernández.

- *ssp. iblis* FELDER, distribuida en Colombia y Venezuela.

- *ssp. negrina* FELDER, distribuida en Ecuador, Perú, Bolivia y Argentina.

- *ssp. oreia* HUBNER, distribuida en Brasil, Paraguay y Argentina.

Lista de las especies del género *Epiphile* DOUBLEDAY, 1849,
reportadas de Nicaragua.

Epiphile adrasta ssp. *adrasta* HEWITSON, 1861.



Figuras : macho y hembra de *Epiphile adrasta* ssp. *adrasta* HEWITSON.


Distribución : [ssp. *escalantei* : México], USA, México*, Guatemala,
Nicaragua (Godman & Salvin, 1883:234-235; Godman &
Salvin, 1901:685) (Matagalpa, Chontales), Costa Rica,
Panamá, [ssp. *bandusia* : Panamá* hasta Perú].

Esta especie se encuentra en bosque húmedo y en bosque nuboso.

Plantas hospederas : Sapindaceae : *Serjania*, *Paulinia*,
Cardiospermum, *Urvillea*.

Frugívoro.
Coprófago.

Epiphile eriopis ssp. *devriesi* JENKINS, 1986.



Figuras : macho y hembra de *Epiphile eriopis* ssp. *devriesi* JENKINS.

Distribución : Nicaragua (Godman & Salvin, 1883:235; D'Abbrera, 1987:560; De Vries, 1987:156; Lamas & Small, 1992:559) (Chontales), Costa Rica, Panamá*, [ssp. *eripis* : Panamá, Colombia*].

Esta especie se encuentra en la parte atlántica del país.

Clave de los machos de *Epiphile* presentes en Nicaragua.

- 1 - Alas posteriores con una mancha central azul.....*Epiphile orea* ssp. *pusios*.
- Alas posteriores con una banda anaranjada.....2

- 2 - Alas anteriores con una banda oblicua anaranjada.....
-*Epiphile adrasta* ssp. *adrasta*.
- Alas anteriores con una banda transversal oblicua blanca.....
-*Epiphile eripis* ssp. *devriesi*.

Clave de las hembras de *Epiphile* presentes en Nicaragua.

- 1 - Alas posteriores café oscuro, a veces con orilla anaranjada.....2
- Alas posteriores anaranjadas con orilla café oscuro.....
-*Epiphile adrasta* ssp. *adrasta*.

- 2 - Alas anteriores con una banda transversal oblicua anaranjada.....*Epiphile orea* ssp. *pusios*.
- Alas anteriores con una banda transversal oblicua blanca.....
-*Epiphile eripis* ssp. *devriesi*.

BIBLIOGRAFIA

- D'ABRERA B. (1987) Butterflies of the Neotropical Region. Part IV. Nymphalidae (Partim). Hill House, pp.526-678.
- DE VRIES P.J. (1987) The Butterflies of Costa Rica and their Natural History. Papilionidae, Pieridae, Nymphalidae. Princeton University Press, 327 pp.