

Mariposas del bosque tropical seco de Nicaragua.

Hilary E. Erenler, Michael P. Gillman & Jean-Michel Maes

Revista Nicaragüense de Entomología, vol. 400, III-2026

Fe de errata

Posteriormente a la publicación del artículo, se detectaron tres errores.

En las ilustraciones de *Strephonota tephraeus* (Lycaenidae) (pp. 249-250), la foto de la pagina 250, de la Laguna de Apoyo, no corresponde a esta especie. Según Aaron Soh, podría tratarse de un ejemplar de *Rekoa marius*, especie adicional para este reporte. *Rekoa marius* (Lucas, 1857) tiene distribución desde el sur de Texas hasta Brasil y Paraguay.

Calpodes triangularis (Kaye, 1914) (Hesperiidae) (pp. 68-72). La fotografía de la pagina 72, del Volcán Concepción pertenece a esta especie. Las otras ocho fotos, todas del Volcán Masaya, pertenecen, según Bernard Hermier, a la especie *Calpodes fusta* (Evans, 1955), con distribución desde México hasta Brasil.

Pellicia (Pellicia) dimidiata dimidiata Herrich-Schäffer, 1870 (Hesperiidae) (p. 152). Bernard Hermier precisa que la subespecie observada es nominativa.