

Capítulo 28

Listado de las especies de hormigas de la región Neotropical

F. Fernández

Al presente, se reconocen alrededor de 3.100 especies de hormigas en la región Neotropical. Este número no incluye las múltiples subespecies, variedades y razas que los mirmecólogos de fines de siglo 19 y comienzos de siglo 20 eran tan aficionados a describir. Cuando las revisiones modernas “limpiaron” los géneros de todos estos nombres superfluos, algunos de ellos quedaron como sinónimos, otros ascendieron a “buenas especies”. No se conocen estimaciones del número de especies para la región Neotropical, pero probablemente esta vasta región aloje más de 4.000. Por otro lado, el Neotrópico parecer ser también el sitio más rico en especies en todo el mundo.

Kempf (1972) elaboró un “catálogo abreviado” de las especies de hormigas de la región Neotropical, del cual Brandão (1991) ofreció un adendo. Este catálogo sigue siendo la fuente primaria y rápida para cualquier estudio sistemático o geográfico en el Neotrópico. Manejado simultáneamente con el catálogo mundial de Bolton (1995), ofrece una buena herramienta para cualquier tipo de estudio faunístico con estos insectos.

En cuanto a listas nacionales, se han publicado las listas de especies de Argentina (Cuezzo 1998), Chile (Kempf 1970; Snelling y Hunt 1976), Colombia (Fernández *et al.* 1996), Cuba (Alayo 1974), Nicaragua (Maes y MacKay 1993), México (Rojas-Fernández 1996), Puerto Rico (Smith 1937), Perú (Escalante 1993) y Uruguay (de Zolessi *et al.* 1989). Fowler (1980) ofrece nuevos registros de especies para el Paraguay y una comparación de la fauna de este país con el resto de la región Neotropical. Longino mantiene una página en Internet

con claves de identificación y listas de especies de hormigas de Costa Rica. En los años 20 Borgmeier publicó un catálogo sinónimo de las hormigas de Brasil, catálogo muy desactualizado. Jonhson y Ward (2002) estudian la poco conocida fauna de hormigas de Baja California (México).

Debido al gran número de cambios, sinonimias y descripciones de nuevas especies, se ha considerado oportuno incluir una lista que refleje todos esos cambios en un solo sitio, 30 años después de la publicación de Kempf. Actualmente se trabaja bastante en revisión de algunos grupos, y al poco de publicarse este libro ocurrirán, inevitablemente, cambios taxonómicos. Sin embargo, esta lista puede ser útil como una referencia rápida de nombres y autores de cada uno de los géneros.

Como se indica más abajo, las listas de Ecitoninae, Pseudomyrmecinae y Dolichoderinae fueron suministradas por Edgard Palacio, Mónica Ospina & Phil S. Ward, y Fabiana Cuezzo, respectivamente.

Esta sección se beneficia enormemente de la reciente revisión de *Pheidole* (Wilson 2003), lo cual permite poner los nombres completos del género “hiperdiverso” de hormigas; igualmente se incluyen todos los nombres posibles de la actual revisión de las hormigas *Camponotus* de William MacKay (en preparación). Alrededor de 70 nuevas especies no se incluyen, aunque sí se consideran en las estadísticas de especies por género.

Las especies con un (*) se conocen sólo de fósiles.

Subfamilia Cerapachyinae

Acantostichini

Acantostichus bentoni MacKay, 1996
A. brevicornis Emery, 1894
A. brevinodis MacKay, 1996
A. concavinodis MacKay, 1996
A. emmae MacKay, 1996
A. femoralis Kusnezov, 1962
A. flexuosus MacKay, 1996

A. kirbyi Emery, 1895
A. laevigatus MacKay, 1996
A. laticornis Forel, 1908
A. lattkei MacKay, 1996
A. punctiscapus MacKay, 1996
A. quadratus Emery, 1895
A. quirozi MacKay, 1996

A. sanchezorum MacKay, 1985
A. serratulus (Smith, 1858)
A. skwarrae Wheeler, 1934
A. texanus Forel, 1904
A. truncatus MacKay, 1996

Cerapachyini

Cerapachys biroi Forel, 1907
C. hondurianum Mann, 1922
C. ierense Weber, 1939
C. neotropicum Weber, 1939
C. splendens Borgmeier, 1957
C. toltecum Forel, 1909

Sphinctomyrmex stali Mayr, 1866

Subfamilia Leptanilloidinae

Asphinctanilloides amazona Brandão, Diniz, Agosti y Delabie, 1999
A. anae Brandão, Diniz, Agosti y Delabie, 1999
A. manauara Brandão, Diniz, Agosti y Delabie, 1999

Cylindromyrmecini

Cylindromyrmex antillanus de Andrade, 1998*
C. boliviae Wheeler, 1924
C. brasiliensis Emery, 1901
C. brevitarsus Santschi, 1925
C. darlingtoni Wheeler, 1937
C. electrinus de Andrade, 1998*
C. escobari de Andrade, 1998
C. godmani Forel, 1899
C. inopinatus de Andrade, 2001*
C. longiceps André, 1892
C. meinerti Forel, 1905
C. striatus Mayr, 1870
C. whymperei (Cameron, 1891)

Leptanilloides biconstricta Mann, 1923
L. improvisa Brandão, Diniz, Agosti y Delabie, 1999
L. legionaria Brandão, Diniz, Agosti y Delabie, 1999
L. sculpturata Brandão, Diniz, Agosti y Delabie, 1999

Subfamilia Dolichoderinae

F. Cuzzo

Anillidris bruchi Santschi, 1936

Azteca adrepens Forel, 1911
A. aesopus Forel, 1908
A. alfari Emery, 1894
A. alpha Wilson, 1985*
A. angusticeps Emery, 1894
A. aragua Longino, 1992
A. aurita Emery, 1894
A. australis W.M. Wheeler, 1942
A. barbifex Forel, 1899
A. bequaerti Wheeler y Bequaert, 1929
A. bicolor beltii Emery, 1893
A. brevicornis (Mayr, 1878)
A. brevicornis boliviana W.M. Wheeler, 1942
A. brevis Forel, 1899
A. chartifex Emery, 1896
A. chartifex cearensis Forel, 1903
A. chartifex decipiens Forel, 1904
A. chartifex lanians Emery, 1912
A. chartifex laticeps Forel, 1899
A. chartifex multinida Forel, 1899
A. chartifex spiriti Forel, 1912
A. chartifex stalactitica Emery, 1896
A. christopherseni Forel, 1912

A. coeruleipennis Emery, 1893
A. constructor Emery, 1896
A. coussapoe Forel, 1904
A. crassicornis Emery, 1894
A. delpini Emery, 1894
A. delpini antillana Forel, 1899
A. delpini trinodadensis Forel, 1899
A. depilis Emery, 1894
A. duckei Forel, 1906
A. duroiae Forel, 1904
A. emeryi Forel, 1904
A. eumeces Wilson, 1985*
A. fasciata Emery, 1893
A. fasciata laeta W.M. Wheeler, 1942
A. fasciata nigricans Forel, 1899
A. fasciata similis Mann, 1916
A. fiebrigi Forel, 1909
A. forelii Emery, 1983
A. forelii championi Forel, 1899
A. forelii eiseni Pergande, 1896
A. forelii raptrix Forel, 1912
A. forelii ursina Forel, 1899
A. forelii xysticola Forel, 1899
A. foveiceps W.M. Wheeler, 1921
A. gnava Forel, 1906

- A. gnava cayenensis* Forel, 1912
A. gnava surubrensis Forel, 1912
A. godmani Forel, 1899
A. goeldii Forel, 1906
A. huberi Forel, 1906
A. hypophylla Forel, 1899
A. jheringi Forel, 1915
A. instabilis F. Smith, 1862
A. instabilis major Forel, 1899
A. instabilis mexicana Emery, 1896
A. isthmica W.M. Wheeler, 1942
A. jelskii Emery, 1894
A. lallemandi Forel, 1899
A. lanuginosa Emery, 1894
A. lanuginosa clariceps Santschi, 1933
A. lanuginosa pruinosa Mann, 1916
A. lattkei Longino, 1992
A. longiceps Emery, 1894
A. longiceps cordincola Forel, 1920
A. longiceps juruensis Forel, 1904
A. longiceps patruelis Forel, 1908
A. longiceps sapii Forel, 1912
A. lucida Forel, 1899
A. luederwaldti Forel, 1909
A. mayrii Emery, 1893
A. merida Longino, 1992
A. minor Forel, 1904
A. muelleri Emery, 1894
A. muelleri pallida Stitz, 1937
A. muelleri terminalis Mann, 1916
A. olitrix Forel, 1904
A. ovaticeps Forel, 1904
A. paraensis Forel, 1904
A. paraensis bondari Borgmeier, 1937
A. petalocephala Longino, 1992
A. pittieri Forel, 1899
A. pittieri emarginatisquamis Forel, 1920
A. polymorpha Forel, 1899
A. polymorpha bahiana Forel, 1912
A. prorsa W.M. Wheeler, 1942
A. salti W.M. Wheeler y Darlington, 1930
A. schimperi Emery, 1894
A. schumannii Emery, 1894
A. schumannii dubia Mann, 1916
A. schumannii taediosa Forel, 1904
A. sericea (Mayr, 1866)
A. severini Emery, 1896
A. stanleyuli Forel, 1920
A. stigmatica Emery, 1896
A. stolli Forel, 1912
A. subopaca Forel, 1899
A. tachigaliae Forel, 1904
A. theresiae Forel, 1899
A. theresiae menceps Forel, 1912
A. tonduzi Forel, 1899
A. tonduzi columbica Forel, 1912
A. trailii Emery, 1894
A. trailli filicis Forel, 1904
A. trailli tillandsiarum W.M. Wheeler, 1942
A. trailli tococae Forel, 1904
A. trianguliceps Forel, 1912
A. trigona Emery, 1894
A. trigona gaigei Forel, 1914
A. trigona mathildae Forel, 1906
A. trigona mediops Forel, 1904
A. trigona subdentata Forel, 1904
A. ulei Forel, 1904
A. ulei cordiae Forel, 1904
A. ulei gagatina W.M. Wheeler, 1942
A. ulei nigricornis Forel, 1904
A. ulei rossi Forel, 1909
A. velox Forel, 1899
A. velox nigra Forel, 1912
A. velox nigriventris Forel, 1899
A. velox rectinota Forel, 1908
A. velox rochai Forel, 1912
A. xanthochroa Roger, 1863

Dolichoderus abruptus (F. Smith, 1858)
D. andinus (Kempf, 1962)
D. antiquus Carpenter, 1930*
D. attelaboides (Fabricius, 1775)
D. baenae MacKay, 1993
D. bidens (Linnaeus, 1758)
D. bispinosus (Olivier, 1792)
D. caribbaeus (Wilson, 1985*)
D. cogitans Forel, 1912
D. curvilobus Lattke, 1987
D. debilis Emery, 1890
D. decollatus Smith, 1858
D. dibolius Wilson, 1985*
D. diversus Emery, 1894
D. doloniger (Roger, 1862)
D. epetreius (Lattke, 1987)
D. fernandezi Mackay, 1993
D. gagates Emery, 1890
D. germani Emery, 1894
D. ghilianii Emery, 1894
D. haradae MacKay, 1993
D. imitator Emery, 1894
D. inermis MacKay, 1993
D. inpai (Harada, 1987)
D. intermedius MacKay, 1993
D. lamellosus (Mayr, 1870)
D. laminatus (Mayr, 1870)
D. laurae MacKay, 1993
D. lobicornis (Kempf, 1959)
D. longicollis MacKay, 1993
D. luederwaldti Santschi, 1921
D. lugens Emery, 1894
D. lujae Santschi, 1923
D. lutosus F. Smith, 1858

- D. mariae* Forel, 1885
D. mesonotalis Forel, 1907
D. obliterated (Scudder, 1877*)
D. omacanthus (Kempf, 1972)
D. piceus MacKay, 1993
*D. plagiatu*s (Mayr, 1870)
D. primitivus (Wilson, 1985*)
D. prolaminatus Wilson, 1985
D. pustulatus Mayr, 1886
D. quadridenticulatus (Roger, 1862)
D. rohweri Carpenter, 1930*
D. rosenbergi Forel, 1911
D. rufescens Mann, 1912
D. rugosus F. Smith, 1858
D. schulzi Emery, 1894
D. septemspinus Emery, 1894
D. setosus (Kempf, 1959)
D. shattucki MacKay, 1993
D. smithi MacKay, 1993
D. spinicollis (Latreille, 1817)
D. spurius Forel, 1903
D. superaculus (Lattke, 1987)
D. taschenbergi Mayr, 1866
D. tristis Mann, 1916
D. validus (Kempf, 1959)
D. varians Mann, 1916
D. voraginosus MacKay, 1993
- Dorymyrmex agallardo*i Snelling, 1975
D. antarcticus Forel, 1904
D. baeri André, 1903
D. bicolor W.M. Wheeler, 1906
D. biconis Forel, 1912
D. bituber Santschi, 1916
D. breviscapis Forel, 1912
*D. breviscapis alvarez*i Santschi, 1922
D. breviscapis elongatulus Santschi, 1919
D. breviscapis speculiceps Santschi, 1922
D. bruchi Forel, 1912
D. bruchi ebeninus Forel, 1914
D. brunneus Forel, 1908
D. carettei Forel, 1913
D. caretteoides Forel, 1914
D. chilensis Forel, 1911
D. confusus (Kusnezov, 1952)
D. coniculus Santschi, 1922
D. emmaericaellus Kusnezov, 1951
D. ensifer Forel, 1912
D. ensifer laevigatus Gallardo, 1916
D. ensifer weiseri Santschi, 1922
D. exsanguis Forel, 1912
D. exsanguis anaemicus Santschi, 1922
D. exsanguis carbonarius Forel, 1913
D. exsanguis sordidus Santschi, 1919
D. flavescens Mayr, 1866
D. flavescens jactans Santschi, 1916
- D. flavescens mandibularis* Santschi, 1925
D. fuscus Santschi, 1922
D. goeldii Forel, 1904
D. goeldii dubius Forel, 1912
D. goeldii fumigatus Forel, 1908
D. goestchi Goetsch, 1933
D. hunti (Snelling, 1975)
D. hypocritus (Snelling, 1975)
D. incomptus (Snelling, 1975)
D. insanus (Buckley, 1866)
D. jheringi Forel, 1912
D. joergenseni Bruch, 1917
D. minutus Emery, 1895
D. morenoi Bruch, 1921
D. morenoi patagon Santschi, 1922
D. pappodes (Snelling, 1975)
D. planidens Mayr, 1868
D. pogonius (Snelling, 1975)
D. pulchellus Santschi, 1922
D. pyramicus Roger, 1863
D. pyramicus alticonis Forel, 1912
D. pyramicus garbei Foel, 1911
D. pyramicus guyanensis Santschi, 1922
D. pyramicus mesonotalis Forel, 1912
D. pyramicus nigriventris Santschi, 1922
D. pyramicus paranensis Santschi, 1922
D. pyramicus peruvianus (W.M. Wheeler, 1919)
D. pyramicus rubriceps Forel, 1912
D. richteri Forel, 1912
D. santschii Gallardo, 1917
D. silvestrii Gallardo, 1916
D. spurius Santschi, 1929
D. steigeri Santschi, 1912
D. tener Mayr, 1868
D. tener donisthorpei Santschi, 1936
D. thoracicus Gallardo, 1916
D. thoracicus gracilis Santschi, 1920
D. thoracicus tigris Santschi, 1925
*D. wolffhugel*i Forel, 1911
- Forelius albiventris* Forel, 1912
F. andinus Kusnezov, 1957
F. bahianus Cuzzo, 2000
F. brasiliensis Forel, 1908
F. breviscapus Forel, 1914
F. breviscapus pusillus Santschi, 1922
F. chalybaeus Emery, 1906
F. fiebrigi Forel, 1912
F. golbachi (Kusnezov, 1953)
F. grandis Forel, 1912
F. instabilis Santschi, 1920
F. lilloi Cuzzo, 2000
F. macrops Kusnezov, 1957
F. maranhaoensis Cuzzo, 2000
F. nigriventris Forel, 1912

F. rubriceps Gakkardo, 1916

F. rufus Gallardo, 1916

Leptomyrmex neotropicus Baroni Urbani, 1980*

Linepithema aspidococtum Kempf, 1969

L. dispertitum Forel, 1885

L. fuscum Mayr, 1866

L. humile Mayr, 1868

L. humile angulatum Emery, 1894

L. humile breviscapum Santschi, 1929

L. humile platense Forel, 1912

L. humile scotti Santschi, 1919

L. humiloides (Wilson, 1985)*

L. impotens Santschi, 1923

L. inacatum Nolton, 1995

L. iniquum Mayr, 1870

L. iniquum bicolor Forel, 1912

L. iniquum nigellum Emery, 1890

L. iniquum succineum Forel, 1908

L. keiteli Forel, 1907

L. keiteli flavescens W.M. Wheeler y Mann, 1914

L. keiteli subfasciatum W.M. Wheeler y Mann,

L. leucomelas Emery, 1894

L. melleum W.M. Wheeler, 1908

L. melleum dominicense W.M. Wheeler, 1913

L. melleum fuscescens W.M. Wheeler, 1908

L. oblongum Santschi, 1929

L. pertaesus Santschi, 1916

L. pordescens W.M. Wheeler, 1942

L. riogranadense Borgmeier, 1928

Tapinoma amazone W.M. Wheeler, 1934

T. antarcticum Forel, 1904

T. atriceps Emery, 1888

T. atriceps breviscapum Forel, 1908

T. gibbosum Stitz, 1933

T. heyeri Forel, 1902

T. heyeri risii Forel, 1912

T. litorale cubaense W.M. Wheeler, 1913

T. melanocephalum Fabricius, 1793

T. melanocephalum coronatum Forel, 1908

T. panamense W.M. Wheeler, 1934

T. ramulorum Emery, 1896

T. ramulorum annellatum W.M. Wheeler, 1934

T. ramulorum inrectum Forel, 1908

T. ramulorum satullum W.M. Wheeler, 1934

T. ramulorum toltecum W.M. Wheeler, 1934

T. rasenum D.R. Smith, y Lavigne, 1973

T. troche Wilson, 1985*

Technomyrmex caritatis Brandão y Baroni Urbani, 1998*

T. fulvus (Wheeler, 1934)

T. fulvus sublucidum (Wheeler, 1934)

T. hispaniolae (Wilson, 1985)*

Subfamilia Formicinae

Brachymyrmecini

Brachymyrmex admotus Mayr, 1887

B. antennatus Santschi, 1929

B. australis Forel, 1901

B. australis curtus Santschi, 1922

B. brevicornis Emery, 1906

B. brevicornoides Forel, 1914

B. bruchi Forel, 1912

B. bruchi rufipes Forel, 1912

B. cavernicola W.M. Wheeler, 1938

B. coactus Mayr, 1887

B. coactus nictitans Emery, 1905

B. coactus robustus Santschi, 1923

B. constrictus Santschi, 1923

B. constrictus bonariensis Santschi, 1933

B. cordemoyi Forel, 1895

B. cordemoyi distinctus Santschi, 1923

B. degener Emery, 1906

B. degener niger Forel, 1912

B. depilis Emery, 1893

B. donisthorpei Santschi, 1939

B. fiebrigi Forel, 1908

B. fiebrigi fumidus Santschi, 1923

B. fiebrigi funicularis Santschi, 1922

B. flavidulus (Roger, 1863)

B. gagates W.M. Wheeler, 1934

B. gaucho Santschi, 1917

B. giardi Emery, 1895

B. giardi cordobensis Santschi, 1929

B. goeldii Forel, 1912

B. heeri Forel, 1874

B. heeri aphidicola Forel, 1909

B. heeri basalis Wheeler, 1921

B. heeri fallax Santschi, 1923

B. heeri obscurior Forel, 1893

B. heeri termitophilus Forel, 1896

B. incisus Forel, 1912

B. laevis Emery, 1895

B. laevis andinus Santschi, 1923

B. laevis fuscus Emery, 1906

B. longicornis Forel, 1907

B. longicornis hemiops Santschi, 1923

B. longicornis pullus Santschi, 1933

B. longicornis immunis Forel, 1908
B. luederwaldti Santschi, 1923
B. luederwaldti attenuatus Santschi, 1929
B. micromegas Emery, 1923
B. minutus Forel, 1893
B. modestus Santschi, 1923
B. musculus Forel, 1899
B. myops Emery, 1906

B. obscurior Forel, 1893
B. oculatus Santschi, 1919
B. patagonicus Mayr, 1868
B. patagonicus atratulus Santschi, 1923
B. pictus Mayr, 1887
B. pictus balboae W.M. Wheeler, 1942
B. pilipes Mayr, 1887
B. santschii Menozzi, 1927
B. tristis Mayr, 1870

Camponotini

W.P. MacKay

Camponotus abdominalis (Fabricius, 1804)
C. abscisus Roger, 1863
C. alboannulatus Mayr, 1887
C. abunanus Mann, 1916
C. agra (F. Smith, 1858)
C. aguilerai Kusnezov, 1951
C. alacer Forel, 1912
C. albicoxis Forel, 1899
C. altivagans W.M. Wheeler, 1936
C. amoris Forel, 1904
C. andrei Forel, 1885
C. anthrax Wheeler, 1911
C. apostolus Forel, 1901
C. apicalis (Mann, 1916)
C. arboreus (F. Smith, 1858)
C. atriceps (F. Smith, 1858)
C. auricomus Roger, 1862
C. balzani Emery, 1894
C. banghaasi Emery, 1903
C. baretoi Santschi, 1922
C. basirectus W.M. Wheeler, 1923
C. beebei W.M. Wheeler, 1918
C. bermudezi Aguayo, 1932
C. bidens Mayr, 1870
C. biolleyi Forel, 1902
C. bispinosus Mayr, 1870
C. blandus (F. Smith, 1858)
C. bocki Forel, 1907
C. bonariensis Mayr, 1868
C. borellii Emery, 1894
C. branneri Mann, 1916
C. brevis Forel, 1899
C. bruchi Forel, 1912
C. bugnioni Forel, 1899
C. cacicus Emery, 1903
C. canescens Mayr, 1870
C. capperi Forel, 1899
C. cameroni Forel, 1892
C. caracalla Forel, 1912
C. caryae (Fitch, 1855)

C. cerberulus Emery, 1920
C. championi Forel, 1899
C. chartifex (F. Smith, 1860)
C. chazaliei Forel, 1899
C. cheesmanae Donisthorpe, 1932
C. chilensis (Spinola, 1851)
C. christophei W.M. Wheeler y Mann, 1914
C. chubutensis Forel, 1931
C. cillae Forel, 1912
C. cingulatus Mayr, 1862
C. clarithorax Creighton, 1950
C. claviscaus Forel, 1899
C. cocosensis W.M. Wheeler, 1919
C. columbicus Forel, 1899
C. compositor Santschi, 1922
C. conspicuus (F. Smith, 1858)
C. constructor Forel, 1899
C. conulus Mayr, 1870
C. corticalis Forel, 1899
C. coruscus (F. Smith, 1862)
C. crassicornis Emery, 1920
C. cressoni André, 1887
C. cuneidorsus Emery, 1920
C. curviscaus Emery, 1896
C. dalmasi Forel, 1899
C. decessor Forel, 1908
C. deletangi Santschi, 1920
C. dimorphus Emery, 1894
C. distinguendus (Spinola, 1851)
C. diversipalpus Santschi, 1922
C. dumetorum W.M. Wheeler, 1910
C. egregius (F. Smith, 1858)
C. elevatus Forel, 1899
C. essigi M.R. Smith, 1923
C. eurynotus Forel, 1907
C. excisus Mayr, 1870
C. fasciatellus Dalla Torre, 1892
C. fastigatus Roger, 1863
C. femoratus (Fabricius, 1804)
C. festinatus (Buckley, 1866)

- C. flavescens* (Fabricius, 1793)
C. folicola Forel, 1904
C. formiciformis Forel, 1885
C. frontalis Pergande, 1896
C. fryi Mann, 1916
C. fumidus Roger, 1863
C. genatus Santschi, 1922
C. geralensis Emery, 1920
C. germaini Emery, 1903
C. gilviventris Roger, 1863
C. godmani Forel, 1899
C. goeldii Forel, 1894
C. gundlachi Mann, 1920
C. haematocephalus Emery, 1903
C. hannani Forel, 1899
C. hedwigae Forel, 1912
C. helleri Emery, 1903
C. hermanni Emery, 1911
C. holzi Forel, 1921
C. hyatii Emery, 1893
C. hybridus Forel, 1901
C. ignestii Menozzi, 1935
C. improprius (Forel, 1879)
C. inca Emery, 1903
C. indicatus Santschi, 1922
C. inlex Forel, 1901
C. innocens Forel, 1909
C. integellus Forel, 1899
C. juliae Emery, 1903
C. keiferi Wheeler, 1934
C. kaura Snelling y Torres, 1998
C. koseritzi Emery, 1888
C. kraepelini Forel, 1901
C. laevigatus (F. Smith, 1858)
C. lancifer Emery, 1894
C. landolti Forel, 1879
C. larvigerus W.M. Wheeler y Mann, 1914
C. latangulus Roger, 1863
C. lenkoi Kempf, 1960
C. lespesii Forel, 1886
C. leydigi Forel, 1886
C. luzzi Forel, 1905
C. lillii Forel, 1908
C. lindigi Mayr, 1870
C. linnaei Forel, 1886
C. maccooki W.M. Wheeler, 1910
C. macrochaeta Emery, 1903
C. melanocephalus Roger, 1863
C. melanoticus Emery, 1894
C. micrositus W.M. Wheeler, 1937
C. mina Forel, 1879
C. minozzi Emery, 1920
C. mocsaryi Forel, 1902
C. moelleri Forel, 1912
C. morosus (F. Smith, 1858)
C. mus Roger, 1863
C. naegeli Forel, 1879
C. nepos Forel, 1912
C. nidulans (F. Smith, 1860)
C. nitens Mayr, 1870
C. nitidior (Santschi, 1921)
C. novogranadensis Mayr, 1870
C. obrevivus Forel, 1899
C. occultus W.M. Wheeler y Mann, 1914
C. ogloblini Santschi, 1934
C. orthocephalus Emery, 1894
C. pachylepis Emery, 1920
C. pallescens Mayr, 1887
C. panamensis Fernández, 2002
C. patimae W.M. Wheeler, 1942
C. pellarius W.M. Wheeler, 1914
C. personatus Emery, 1894
C. picipes (Olivier, 1792)
C. pittieri Forel, 1899
C. planatus Roger, 1863
C. planus F. Smith, 1877
C. platytarsus Roger, 1863
C. plombyi W.M. Wheeler y Mann, 1914
C. piceatus (Norton, 1868)
C. propinquellus Emery, 1920
C. propinquus Mayr, 1887
C. pullatus Mayr, 1866
C. punctatus Forel, 1912
C. punctulatus Mayr, 1868
C. quercicola M.R. Smith, 1954
C. ramulorum W.M. Wheeler, 1905
C. rapax (Fabricius, 1804)
C. rectangularis Emery, 1890
C. rector Santschi, 1923
C. renggeri Emery, 1894
C. ruficornis Emery, 1895
C. rufipes (Fabricius, 1775)
C. rufipilis Aguayo, 1932
C. rusticus Santschi, 1916
C. salvini Forel, 1899
C. sanctaefidei Dalla Torre, 1892
C. sansabeanus (Buckley, 1866)
C. santosi Forel, 1908
C. saussurei Forel, 1879
C. schmalzi Emery, 1894
C. semitestaceus Snelling, 1970
C. sericatus Mayr, 1887
C. scissus Mayr, 1887
C. sculptor Santschi, 1920
C. senex (F. Smith, 1858)
C. sericatus Mayr, 1887
C. sericeiventris Guérin-Méneville, 1838
C. setipes Forel, 1904
C. sexguttatus (Fabricius, 1793)
C. sharpi Forel, 1893
C. silvestrii Emery, 1906
C. silvicola Forel, 1902

C. simillimus (F. Smith, 1862)
C. socius Roger, 1863
C. socorroensis W.M. Wheeler, 1934
C. sphaericus Roger, 1863
C. sphenoidalis Mayr, 1870
C. spinolae Roger, 1863
C. subcircularis Emery, 1920
C. subdepilis W.M. Wheeler, 1917
C. substitutus Emery, 1894
C. subtruncatus Borgmeier, 1929
C. taino Snelling y Torres, 1998
C. tepicanus Pergande, 1896
C. terbimaculatus Emery, 1920
C. termitarius Emery, 1902
C. tenuiscapus Roger, 1863
C. testaceus Emery, 1894
C. thysanopus W.M. Wheeler, 1937
C. torrei Aguayo, 1932
C. tonduzi Forel, 1899
C. traili Mayr, 1878
C. trapeziceps Forel, 1908
C. trapezoideus Mayr, 1870
C. tripartitus Mayr, 1887
C. ulcerosus W.M. Wheeler, 1910
C. ulei Forel, 1904
C. ulvarum Forel, 1899
C. urichi Forel, 1899
C. ustus Forel, 1879
C. verae Forel, 1908
C. vicinus Mayr, 1870
C. westermanni Mayr, 1862
C. wheeleri Mann, 1916
C. wytsmani Emery, 1920
C. xanthogaster Santschi, 1924
C. zenon Forel, 1912
C. zoc Forel, 1879

Formicini

Formica argentea W.M. Wheeler, 1912
F. francoeuri Bolton, 1995
F. gnava Buckley, 1866
F. integroides W.M. Wheeler, 1913
F. lasioides Emery, 1893
F. moki Wheeler, 1906
F. perpilosa Wheeler, 1913
F. subpolita Mayr, 1886
F. xerophila M.R. Smith, 1939

Polyergus breviceps Emery, 1893

Gigantiopini

Gigantiops destructor (Fabricius, 1804)

Lasiini

Acanthomyops californicus W.M. Wheeler, 1917
A. mexicanus W.M. Wheeler, 1914

Lasius alienus Foerster, 1850
L. niger (Linnaeus, 1758)
L. sitiens Wilson, 1955

Myrmecocystus depilis (Forel, 1907)
M. flaviceps W.M. Wheeler, 1912
M. intonsus Snelling, 1976
M. kennedyi Snelling, 1969
M. melliger Forel, 1886
M. mendax W.M. Wheeler, 1908
M. mexicanus Wesmael, 1838
M. mimicus W.M. Wheeler, 1908
M. navajo W.M. Wheeler, 1908
M. perimeces Snelling, 1975
M. placodops Forel, 1908
M. romainei Snelling, 1975
M. semirufus Emery, 1893
M. tenuinodis Snelling, 1976
M. testaceus Emery, 1893
M. wheeleri Snelling, 1971
M. yuma W.M. Wheeler, 1912

Paratrechina anthracina (Roger, 1863)
P. brasiliensis (Mayr, 1862)
P. bruesii W.M. Wheeler, 1903
P. burgessi Trager, 1984
P. caeciliae (Forel, 1899)
P. caecilia elevata Forel, 1908
P. cisipa D.R. Smith y Lavigne, 1973
P. darlingtoni W.M. Wheeler, 1936
P. dispar Forel, 1909
P. fulva (Mayr, 1862)
P. fulva fumata (Forel, 1909)
P. fulva fumatipennis (Forel, 1915)
P. fulva biolleyi (Forel, 1908)
P. fulva cubana (Santschi, 1930)
P. fulva incisa (Forel, 1908)
P. fulva longiscapa (Forel, 1908)
P. fulva nesiotis (W.M. Wheeler, 1919)
P. goeldii (Forel, 1912)
P. guatemalensis (Forel, 1885)
P. guatemalensis cocoensis (Forel, 1902)
P. guatemalensis edenensis (W.M. Wheeler, 1924)
P. hystrix Trager, 1984
P. johannae (Forel, 1912)
P. johannae dibullana (Forel, 1912)
P. laevigata MacKay, 1998
P. lietzi (Forel, 1908)
P. longicornis Latreille, 1802
P. mexicana (Forel, 1899)
P. microps (M.R. Smith, 1937)



P. myops (Mann, 1920)
P. nodifera (Mayr, 1870)
P. pearsei (W.M. Wheeler, 1938)
P. pubens (Forel, 1893)
P. silvestrii (Emery, 1906)
P. silvestrii kuenzleri (Forel, 1909)
P. staudingeri (Forel, 1912)
P. steinheili (Forel, 1893)
P. steinheili minuta (Forel, 1893)
P. tococae (W.M. Wheeler, 1929)
P. vividula (Nylander, 1846)
P. vividula antillana (Forel, 1893)
P. vividula australis (Santschi, 1929)
P. vividula docilis (Forel, 1908)

Prenolepis acuminata Forel, 1911
P. imparis Say, 1836

Melophorini

Lasiophanes atriventris (F. Smith, 1858)
L. hoffmanni (Forel, 1903)
L. perplexus (Santschi, 1920)
L. picinus (Roger, 1863)
L. valdiviensis (Forel, 1904)

Myrmelachistini

Myrmelachista ambigua Forel, 1893
M. amicta W.M. Wheeler, 1934
M. arborea Forel, 1909
M. arborea nasuta Forel, 1912
M. arthuri Forel, 1903
M. arthuri brunneiceps Forel, 1908
M. bambusarum Forel, 1903
M. bettinae Forel, 1903
M. brevicornis W.M. Wheeler, 1934
M. bruchi Santschi, 1922
M. catharinae Mayr, 1887
M. catharinae maior Santschi, 1936
M. catharinae petropolitana Santschi, 1936
M. catharinae intermedia Santschi, 1929
M. chilensis Forel, 1904
M. costaricensis W.M. Wheeler, 1934
M. dalmasi Forel, 1912
M. donisthorpei W.M. Wheeler, 1934
M. elata Santschi, 1922
M. elongata Santschi, 1925
M. flavida W.M. Wheeler, 1934
M. gagates W.M. Wheeler, 1936
M. gagatina Emery, 1894
M. gallicola Mayr, 1887
M. goeldii Forel, 1903
M. guyanensis W.M. Wheeler, 1934
M. hoffmanni Forel, 1903
M. kloetersi Forel, 1903

M. kraatzi Roger, 1863
M. longinoda Forel, 1899
M. mayri Forel, 1886
M. mexicana W.M. Wheeler, 1934
M. muelleri Forel, 1903
M. nigella (Roger, 1863)
M. nigella ruficornis Santschi, 1936
M. nodigera Mayr, 1887
M. nodigera flavicornis Emery, 1896
M. nodigera pallida Forel, 1909
M. paderewskii Forel, 1908
M. plebecula Menozzi, 1927
M. ramulorum W.M. Wheeler, 1908
M. ramulorum fortior W.M. Wheeler, 1934
M. reclusi Forel, 1903
M. reichenspergeri Santschi, 1922
M. reticulata Borgmeier, 1928
M. rogeri Ern. André, 1887
M. rogeri manni W.M. Wheeler, 1934
M. rogeri rubriceps Mann, 1920
M. rudolphi Forel, 1903
M. ruzskyii Forel, 1903
M. schachovskoi Kusnezov, 1951
M. schumanni Emery, 1890
M. schumanni cordincola W.M. Wheeler, 1934
M. skwarrae W.M. Wheeler, 1934
M. skwarrae laeta W.M. Wheeler, 1934
M. skwarrae picea W.M. Wheeler, 1934
M. ulei Forel, 1904
M. ulei dubia Forel, 1912
M. vicina Kusnezov, 1951
M. zeledoni Emery, 1896
M. zeledoni thiemei Emery, 1906

Plagiolepidini

Acropyga berwicki W.M. Wheeler, 1935
A. borgmeieri Donisthorpe, 1939
A. bruchi Santschi, 1929
A. decedens (Mayr, 1887)
A. donisthorpei Weber, 1944
A. dubitata (W.M. Wheeler y Mann, 1914)
A. exsanguis (W.M. Wheeler, 1909)
A. fuhrmanni (Forel, 1914)
A. goeldii Forel, 1893
A. goeldii columbica (Forel, 1912)
A. goeldii tridentata (Forel, 1912)
A. guianensis Weber, 1944
A. kathrynae Weber, 1944
A. marshalli (Crawley, 1921)
A. mesonotalis Weber, 1944
A. oko Weber, 1944
A. pachycera Emery, 1906
A. paludis Weber, 1944
A. panamensis Weber, 1944
A. paramaribensis Borgmeier, 1933

A. parvidens (W.M. Wheeler y Mann, 1914)
A. pickeli Borgmeier, 1927
A. quadriceps Weber, 1944
A. robae Donisthorpe, 1936
A. rutgersi Buenzli, 1935

A. smithii Forel, 1893
A. trinitatis Weber, 1944
A. urichi Weber, 1944
A. wheeleri Mann, 1922

Anoplolepis gracilipes (Smith, 1857)

Subfamilia Ecitoninae

E. E. Palacio

Cheliomyrmex andicola Emery, 1894
C. audax Santschi, 1921
C. megalonyx W.M. Wheeler, 1921
C. morosus (F. Smith, 1859)

Eciton burchelli (Westwood, 1842)
E. drepanophorum F. Smith, 1858
E. dulcium Forel, 1912
E. hamatum (Fabricius, 1782)
E. jansoni Forel, 1912
E. lucanoides Emery, 1894
E. mexicanum Roger, 1863
E. quadriglume (Haliday, 1836)
E. rapax F. Smith, 1855
E. setigaster Borgmeier, 1953
E. uncinatum Borgmeier, 1953
E. vagans (Olivier, 1792)

Labidus auropubens (Santschi, 1920)
L. coecus (Latreille, 1802)
L. curvipes (Emery, 1900)
L. mars (Forel, 1912)
L. nero (Santschi, 1930)
L. praedator (F. Smith, 1858)
L. spininodis (Emery, 1890)
L. truncatidens (Santschi, 1920)

Neivamyrmex adnepos (W.M. Wheeler, 1922)
N. agilis Borgmeier, 1953
N. alfaroi (Emery, 1890)
N. andrei (Emery, 1901)
N. angulimandibulatus Watkins, 1974
N. angustinodis (Emery, 1888)
N. antillanus (Forel, 1897)
N. asper Borgmeier, 1955
N. balzani (Emery, 1894)
N. bohlsi (Emery, 1896)
N. bruchi (Forel, 1912)
N. californicus Mayr, 1870
N. carettei (Forel, 1913)
N. carinifrons Borgmeier, 1953
N. carolinensis (Emery, 1894)
N. chamelensis Watkins, 1986
N. clavifemur Borgmeier, 1953

N. cloosae (Forel, 1912)
N. compressinodis Borgmeier, 1953
N. cornutus Watkins, 1975
N. crassiscapus Watkins, 1990
N. cratensis Borgmeier, 1953
N. cristatus (André, 1889)
N. curvinotus Watkins, 1994
N. densepunctatus (Borgmeier, 1933)
N. detectus Borgmeier, 1953
N. diabolus (Forel, 1912)
N. diana (Forel, 1912)
N. digitistipus Watkins, 1975
N. diversinodis (Borgmeier, 1933)
N. dorbignii (Shuckard, 1840)
N. ectopus Wilson, 1985*
N. emersoni (W. M. Wheeler, 1921)
N. emeryi (Santschi, 1921)
N. erichsonii (Westwood, 1842)
N. falcifer (Emery, 1900)
N. fallax Borgmeier, 1953
N. foveolatus Borgmeier, 1953
N. fumosus (Forel, 1913)
N. fuscipennis (M.R. Smith, 1942)
N. genalis Borgmeier, 1953
N. gibbatus Borgmeier, 1953
N. goeldii (Forel, 1901)
N. graciellae (Mann, 1926)
N. gracilis Borgmeier, 1955
N. gradualis Borgmeier, 1953
N. guerinii (Shuckard, 1840)
N. guyanensis (Santschi, 1916)
N. halidaii (Shuckard, 1840)
N. harrisi (Haldeman, 1852)
N. hetschkoi (Mayr, 1886)
N. hopei (Shuckard, 1840)
N. humilis (Borgmeier, 1939)
N. iheringi (Forel, 1908)
N. imbellis (Emery, 1900)
N. inca (Santschi, 1921)
N. inflatus Borgmeier, 1958
N. iridescens Borgmeier, 1950
N. jerrmanni Forel, 1901
N. klugii Shuckard, 1840
N. laevigatus (Borgmeier, 1948)

N. laticapus (Emery, 1901)
N. legionis (F. Smith, 1855)
N. leonardi (W.M. Wheeler, 1915)
N. leptognathus (Emery, 1900)
N. lieselae (Forel, 1913)
N. longiscapus Borgmeier, 1953
N. macrodentatus (Menozzi, 1931)
N. macropterus Borgmeier, 1953
N. manni (W.M. Wheeler, 1914)
N. maxillosus (Emery, 1900)
N. megathrix Kempf, 1961
N. melanocephalus (Emery, 1895)
N. melshaemeri (Haldeman, 1852)
N. micans Borgmeier, 1953
N. minensis (Borgmeier, 1928)
N. minor (Cresson, 1872)
N. modestus (Borgmeier, 1933)
N. mojave Smith, 1943
N. nigrescens (Cresson, 1872)
N. nordenskioldii (Holmgren, 1908)
N. nyensis Watkins, 1977
N. opacithorax (Emery, 1894)
N. orthonotus (Borgmeier, 1933)
N. pacificus Borgmeier, 1955
N. pauxillus (W.M. Wheeler, 1903)
N. perplexus Borgmeier, 1953
N. pertii (Shuckard, 1840)
N. physognathus (Emery, 1900)
N. pilosus (F. Smith, 1858)
N. piraticus Borgmeier, 1953

N. planidens Borgmeier, 1953
N. planidorsus (Emery, 1906)
N. postangustatus (Borgmeier, 1934)
N. postcarinatus Borgmeier, 1953
N. pseudops (Forel, 1909)
N. puerulus Borgmeier, 1955
N. pulchellus Borgmeier, 1955
N. pullus Borgmeier, 1953
N. punctaticeps (Emery, 1894)
N. quadratooccipitus Watkins, 1975
N. radoszkowskii (Emery, 1900)
N. raptor (Forel, 1911)
N. romandii (Shuckard, 1840)
N. rosenbergi (Forel, 1911)
N. rugulosus Borgmeier, 1953
N. scutellaris Borgmeier, 1953
N. shuckardi (Emery, 1900)
N. spatulatus (Borgmeier, 1939)
N. spoliator (Forel, 1899)
N. sulcatus (Mayr, 1868)
N. sumichrasti (Norton, 1868)
N. swainsonii (Shuckard, 1840)
N. tenuis (Borgmeier, 1953)
N. texanus Watkins, 1972
N. tristis (Forel, 1901)
N. vicinus Borgmeier, 1953
N. walkerii (Westwood, 1842)

Nomamyrmex esenbeckii (Westwood, 1842)
N. hartigii (Westwood, 1842)

Subfamilia Myrmeciinae

Ameghinoia piatnitzkyi Viana y Haedo Rossi, 1957*
Polanskiella sp. Rossi de García, 1983*

Cariridris bipetiolata Brandão y Martins-Neto, 1990*

Subfamilia Myrmicinae

Grupo *Adelomyrmex*

Adelomyrmex brevispinosus Fernández, 2003
A. foveolatus Fernández, 2003
A. laevigatus MacKay, 2003
A. micans Fernández, 2003
A. microps Fernández, 2003
A. minimus Fernández, 2003
A. myops (W.M. Wheeler, 1910)
A. tristani (Menozzi, 1931)
A. silvestrii (Menozzi, 1931)

Agroecomyrmecini

Tatuidris tatusia Brown y Kempf, 1960

Attini

Acromyrmex ambiguus Emery, 1888
A. argentinus (Gallardo, 1916)
A. argentinus platensis (Santschi, 1926)
A. aspersus (F. Smith, 1858)
A. aspersus fuhrmanni Forel, 1914
A. coronatus (Fabricius, 1804)
A. coronatus andicola Emery, 1922
A. coronatus globoculis Kempf, 1972
A. coronatus importunus Santschi, 1925
A. coronatus panamensis Forel, 1899
A. coronatus panamensis angustatus Forel, 1908

- A. coronatus rectispinus* Forel, 1908
A. crassispinus Forel, 1909
A. disciger (Mayr, 1887)
A. echinator Forel, 1899
A. evenkul Bolton, 1995
A. fracticornis Forel, 1909
A. heyeri (Forel, 1899)
A. hispidus Santschi, 1925
A. hispidus fallax Santschi, 1925
A. hispidus formosus Santschi, 1925
A. hystrix (Latreille, 1802)
A. hystrix ajax Forel, 1909
A. insunuator Schultz, Bekkevold y Boomsma, 1998
A. landolti Forel, 1885
A. laticeps Emery, 1905
A. laticeps nigrosetosus Forel, 1908
A. lobicornis Emery, 1888
A. lobicornis cochlearis Santschi, 1933
A. lobicornis ferrugineus Emery, 1905
A. lobicornis pencosensis Forel, 1914
A. lobicornis pruiniosior Santschi, 1916
A. lundii (Guérin, 1838)
A. lundii parallelus Santschi, 1916
A. lundii boliviensis Emery, 1905
A. lundii carli Gonçalves, 1967
A. lundii decolor Emery, 1905
A. lundii pubescens Emery, 1905
A. lundii pubescens chacoensis Santschi, 1916
A. niger (F. Smith, 1858)
A. nobilis Santschi, 1939
A. octospinosus (Reich, 1793)
A. octospinosus cubanus W.M. Wheeler, 1937
A. octospinosus echinator Forel, 1899
A. octospinosus ekchuah W.M. Wheeler, 1937
A. octospinosus inti Wheeler, 1937
A. octospinosus volcanus Wheeler, 1937
A. pulvereus Santschi, 1919
A. rugosus (F. Smith, 1858)
A. rugosus santschii Forel, 1912
A. rugosus rochai Forel, 1904
A. silvestrii Emery, 1905
A. silvestrii bruchi Forel, 1912
A. striatus (Roger, 1863)
A. subterraneus Forel, 1893
A. subterraneus ogloblini Santschi, 1933
A. subterraneus brunneus Forel, 1912
A. subterraneus molestans Santschi, 1925
A. subterraneus peruvianus Borgmeier, 1940
A. versicolor (Pergande, 1894)
- Apterostigma abdita* Mann, 1922
A. acre Lattke, 1997
A. ancilonodum Lattke, 1997
A. andense Lattke, 1997
A. angustum Lattke, 1997
A. auriculatum Lattke, 1997
A. avium Lattke, 1997
A. bolivianum Weber, 1938
- A. bruchi* Santschi, 1919
A. callipygium Lattke, 1997
A. calverti W.M. Wheeler, 1911
A. carinatum Lattke, 1997
A. collare Emery, 1896
A. convexum Lattke, 1997
A. chocoense Lattke, 1997
A. dentigerum W.M. Wheeler, 1925
A. depressum Lattke, 1997
A. discrepans Forel, 1912
A. dorotheae Weber, 1937
A. epinotale Weber, 1937
A. goniodes Lattke, 1997
A. ierense Weber, 1937
A. jubatum W.M. Wheeler, 1925
A. madidiense Weber, 1938
A. manni Weber, 1938
A. mayri Forel, 1893
A. mexicanum Lattke, 1997
A. moelleri Forel, 1892
A. pallidum Weber, 1937
A. pariense Lattke, 1997
A. peruvianum W.M. Wheeler, 1925
A. pilosum Mayr, 1865
A. reburum Lattke, 1997
A. robustum Emery, 1897
A. scutellare Forel, 1895
A. serratum Lattke, 1997
A. spiculum Lattke, 1997
A. steigeri Santschi, 1912
A. tachirensis Lattke, 1997
A. tholiforme Lattke, 1997
A. tramitis Weber, 1940
A. tropicoxa Lattke, 1997
A. trapeziforme Lattke, 1997
A. turgidum Lattke, 1997
A. urichii Forel, 1893
A. wasmanni Forel, 1892
A. zip Weber, 1938
- Atta capiguara* Gonçalves, 1944
A. cephalotes (Linnaeus, 1758)
A. colombica Guérin, 1845
A. insularis Guérin, 1845
A. laevigata (F. Smith, 1858)
A. mexicana (F. Smith, 1858)
A. opaciceps Borgmeier, 1939
A. robusta Borgmeier, 1939
A. sexdens (Linnaeus, 1758)
A. vollenweideri Forel, 1893
- Cyphomyrmex auritus* Mayr, 1887
C. bicarinatus Snelling y Longino, 1992
C. bicornis Forel, 1896
C. bigibbosus Emery, 1894
C. bruchi Santschi, 1917
C. castagnei MacKay y Baena, 1993
C. cornutus Kempf, 1968

- C. costatus* Mann, 1922
C. daguerrei Santschi, 1933
C. dixus Snelling y Longino, 1992
C. faunulus W.M. Wheeler, 1925
C. flavidus Pergande, 1896
C. foxi André, 1892
C. hamulatus Weber, 1938
C. kirbyi Mayr, 1887
C. laevigatus Weber, 1938
C. lectus Forel, 1911
C. lilloanus Kusnezov, 1949
C. longiscapus Weber, 1940
C. major Forel, 1901
C. minutus Mayr, 1862
C. morschi Emery, 1888
C. muelleri Schultz y Solomon, 2002
C. nemei Kusnezov, 1957
C. nesiotus Snelling y Longino, 1992
C. occultus Kempf, 1964
C. olitor Forel, 1893
C. paniscus W.M. Wheeler, 1925
C. peltatus Kempf, 1966
C. plaumanni Kempf, 1962
C. podargus Snelling y Longino, 1992
C. rimosus (Spinola, 1853)
C. salvini Forel, 1899
C. strigatus Mayr, 1887
C. transversus Emery, 1894
C. vallensis Kusnezov, 1949
C. vorticus Weber, 1940
C. wheeleri Forel, 1900
- Mycetagroicus cerradensis* Brandão y Mayhé-Nunes, 2001
M. triangularis Brandão y Mayhé-Nunes, 2001
M. urbanus Brandão y Mayhé-Nunes, 2001
- Mycetarotes parallelus* (Emery, 1905)
M. senticosus Kempf, 1960
- Mycetophylax bruchi* (Santschi, 1916)
M. bruchi pauper Santschi, 1923
M. conformis (Mayr, 1884)
M. cristulatus (Santschi, 1922)
M. cristulatus emmae Santschi, 1929
M. emeryi (Forel, 1907)
M. emeryi arenicola (Forel, 1912)
M. emeryi argentina (Santschi, 1916)
M. emeryi bolivari Weber, 1948
M. emeryi fortis (Forel, 1912)
M. emeryi gallardoi (Santschi, 1922)
M. emeryi hubrichi Santschi, 1925
M. emeryi weiseri Santschi, 1929
M. glaber Weber, 1948
M. simplex Emery, 1888
- Mycetosoritis aspera* Mayr, 1887
M. clorindae Kusnezov, 1949
- M. explicata* Kempf, 1968
M. vinsoni Mackay, 1998
- Mycocepurus goeldii* Forel, 1893
M. curvispinosus MacKay, 1998
M. obsoletus Emery, 1913
M. smithii Forel, 1893
M. tardus Weber, 1940
- Myrmicocrypta boliviana* Weber, 1938
M. bruchi Santschi, 1936
M. buenzlii Borgmeier, 1934
M. collaris Emery, 1913
M. dilacerata Forel, 1885
M. dilacerata cornuta Forel, 1899
M. ednaella Mann, 1922
M. elisabethae Weber, 1937
M. foreli Mann, 1916
M. foreli sorianensis W.M. Wheeler, 1925
M. godmani Forel, 1899
M. guianensis Weber, 1937
M. infuscata Weber, 1946
M. longinoda Weber, 1938
M. microphthalma Borgmeier, 1948
M. occipitalis Weber, 1938
M. ogloblini Santschi, 1936
M. rudiscapus Emery, 1913
M. spinosa Weber, 1937
M. squamosa Smith, 1860
M. squamosa uncinata Mayr, 1887
M. subnitida Forel, 1899
M. triangulata Forel, 1912
M. triangulata peruviana Emery, 1913
M. tuberculata Weber, 1938
M. unidentata Weber, 1937
M. urichi Weber, 1937
M. weyrauchi Borgmeier, 1948
- Sericomyrmex amabilis* W.M. Wheeler, 1925
S. aztecus Forel, 1885
S. beniensis Weber, 1938
S. bondari Borgmeier, 1937
S. burchelli Forel, 1905
S. diego Forel, 1912
S. harekulli Weber, 1937
S. harekulli arawakensis Weber, 1937
S. impexus W.M. Wheeler, 1925
S. luederwaldti Santschi, 1925
S. lutzii W.M. Wheeler, 1916
S. mayri Forel, 1912
S. moreirai Santschi, 1925
S. myersi Weber, 1937
S. opacus Mayr, 1865
S. opacus muelleri Forel, 1912
S. parvulus Forel, 1912
S. saussurei Emery, 1894
S. scrobifer Forel, 1911

S. urichi Forel, 1912
S. urichi maracas Weber, 1937
S. zacapanus W.M. Wheeler, 1925

Trachymyrmex agudensis Kempf, 1967
T. bugnioni Forel, 1912
T. carib Weber, 1945
T. cornetzi Forel, 1912
T. dichrous Kempf, 1967
T. diversus Mann, 1916
T. echinus Weber, 1938
T. farinosus Emery, 1894
T. fiebrigi Santschi, 1916
T. gaigei Forel, 1914
T. guianensis Weber, 1937
T. holmgreni W.M. Wheeler, 1925
T. intermedius Forel, 1909
T. irmgardae Forel, 1912
T. isthmicus Santschi, 1931
T. jamaicensis André, 1893
T. jamaicensis frontalis Santschi, 1925

Basicerotini

Basiceros convexiceps Mayr, 1887
B. manni Brown y Kempf, 1960
B. redux (Donisthorpe, 1939)
B. singularis (F. Smith, 1858)
B. scambognathus Brown, 1949

Eurhopalothrix alopeciosa Brown y Kempf, 1960
E. bolau (Mayr, 1870)
E. bruchi Santschi, 1922
E. clypeata Brown y Kempf, 1960
E. gravis (Mann, 1922)
E. lenkoi Kempf, 1967
E. pilulifera Brown y Kempf, 1960
E. speciosa Brown y Kempf, 1960
E. spectabilis Kempf, 1962

Octostruma balzani Emery, 1894
O. batesi Emery, 1894
O. impressa Palacio, 1997
O. inca Brown y Kempf, 1960
O. iheringi Emery, 1887
O. petiolata Mayr, 1887
O. rugifera Mayr, 1887
O. rugiferoides Brown y Kempf, 1960
O. stenognatha Brown y Kempf, 1960
O. stenoscapa Palacio, 1997
O. wheeleri Mann, 1922

Protalaridris armata Brown, 1980

Rhopalothrix acutipilis Kempf, 1962
R. ciliata Mayr, 1870

R. isthmica Weber, 1941
R. kusnezovi Brown y Kempf, 1960
R. plaumanni Brown y Kempf, 1960
R. stannardi Brown y Kempf, 1960
R. weberi Brown y Kempf, 1960

Talaridris mandibularis Weber, 1941

Blepharidattini

Blepharidatta brasiliensis W.M. Wheeler, 1915
B. conops Kempf, 1967

Wasmannia affinis Santschi, 1929
W. auropunctata Roger, 1863
W. auropunctata australis Emery, 1894
W. auropunctata laevifrons Emery, 1894
W. auropunctata nigricans Emery, 1906
W. auropunctata obscura Forel, 1912
W. auropunctata rugosa (Forel, 1886)
W. auropunctata pulla Santschi, 1931
W. iheringi Forel, 1908
W. lutzii Forel, 1908
W. rochai Forel, 1912
W. scrobifera Kempf, 1961
W. sigmoidea (Mayr, 1884)
W. sulcaticeps Emery, 1894
W. sulcaticeps weiseri Forel, 1914
W. villosa Emery, 1894
W. williamsoni Kusnezov, 1952

Cephalotini

Cephalotes adolphi (Emery, 1905)
C. alfaroi (Emery, 1890)
C. alveolatus (Vierbergen y Scheven, 1995) *
C. angustus (Mayr, 1862)
C. argentiventris Andrade, 1999
C. atratus (Linnaeus, 1758)
C. auriger Andrade, 1999
C. auricomus (Wheeler, 1936)
C. basalis (Smith, 1876)
C. betoi Andrade, 1999
C. biguttatus (Emery, 1890)
C. bimaculatus (F. Smith, 1860)
C. bivestitus (Santschi, 1922)
C. bloosi Baroni Urbani y Andrade, 1999*
C. bohlsi (Emery, 1896)
C. borgmeieri (Kempf, 1951)
C. brevispineus Andrade, 1999*
C. bruchi (Forel, 1912)
C. caribicus Andrade, 1999*
C. chacmul Snelling, 1999
C. christophersenii (Forel, 1912)
C. clypeatus (Fabricius, 1804)
C. coffeae (Kempf, 1953)



- C. columbicus* (Forel, 1912)
C. complanatus (Guérin, 1845)
C. conspersus (F. Smith, 1867)
C. cordatus (F. Smith, 1853)
C. cordiae (Stitz, 1913)
C. cordiventris (Santschi, 1931)
C. crenaticeps (Mayr, 1866)
C. cristatus (Emery, 1890)
C. curvistriatus (Forel, 1899)
C. decolor Andrade, 1999
C. decoloratus Andrade, 1999
C. dentidorsum Andrade, 1999
C. depressus (Klug, 1824)
C. dieteri Baroni Urbani, 1999*
C. duckei (Forel, 1906)
C. ecuadorialis Andrade, 1999
C. eduarduli (Forel, 1920)
C. emeryi (Forel, 1912)
C. femoralis (F. Smith, 1853)
C. fiebrigi (Forel, 1906)
C. flavigaster Andrade, 1999
C. foliaceus (Emery, 1905)
C. fossithorax (Santschi, 1921)
C. frigidus (Kempf, 1958)
C. goeldii (Forel, 1912)
C. goniodontus Andrade, 1999
C. grandinosus (F. Smith, 1860)
C. guayaki (Andrade, 1999)
C. hamulus (Roger, 1863)
C. hirsutus Andrade, 1999
C. hispaniolicus Andrade, 1999*
C. inaequalis (Mann, 1916)
C. inca (Santschi, 1911)
C. incertus (Emery, 1905)
C. insularis (W.M. Wheeler, 1934)
C. integerrimus (Vierbergen y Scheven, 1995)*
C. jamaicensis (Forel, 1922)
C. jansei (Vierbergen y Scheven, 1995)*
C. jheringi (Emery, 1894)
C. klugi (Emery, 1894)
C. kukulcan Snelling, 1999
C. laminatus (Smith, 1860)
C. lanuginosus (Santschi, 1919)
C. lenca Andrade, 1999
C. liepini Andrade, 1999
C. liogaster (Santschi, 1916)
C. maculatus (F. Smith, 1876)
C. manni (Kempf, 1951)
C. marginatus (Fabricius, 1804)
C. maya Andrade, 1999*
C. membranaceus (Klug, 1824)
C. minutus (Fabricius, 1804)
C. mompox Andrade, 1999
C. multispinosus (Norton, 1868)
C. nilpiei Andrade, 1999
C. notatus (Mayr, 1866)
C. obscurus (Vierbergen y Scheven, 1995)*
C. olmecus Andrade, 1999*
C. oculatus (Spinola, 1853)
C. opacus Santschi, 1920
C. pallens (Klug, 1804)
C. pallidicephalus (F. Smith, 1876)
C. pallidoides Andrade, 1999
C. pallidus Andrade, 1999
C. palta Andrade, 1999
C. palustris Andrade, 1999
C. patei (Kempf, 1951)
C. patellaris (Mayr, 1866)
C. pavonii (Latreille, 1809)
C. pellans Andrade, 1999
C. persimilis Andrade, 1999
C. persimplex Andrade, 1999
C. peruviansis Andrade, 1999
C. pileini Andrade, 1999
C. pilosus (Emery, 1896)
C. pinelii (Guérin y Méneville, 1844)
C. placidus (F. Smith, 1860)
C. poinari Baroni Urbani, 1999*
C. porrasi (W.M. Wheeler, 1942)
C. prodigiosus (Santschi, 1921)
C. pusillus (Klug, 1824)
C. quadratus (Mayr, 1868)
C. ramiphilus (Forel, 1904)
C. resinae Andrade, 1999*
C. rohweri (W.M. Wheeler, 1916)
C. scutulatus (F. Smith, 1867)
C. serraticeps (F. Smith, 1858)
C. serratus (Vierbergen y Scheven, 1995)*
C. setulifer (Emery, 1894)
C. simillimus (Kempf, 1951)
C. sobrius (Kempf, 1958)
C. solidus (Kempf, 1974)
C. spinosus (Mayr, 1862)
C. squamosus (Vierbergen y Scheven, 1995)*
C. sucinus Andrade, 1999*
C. supercilii Andrade, 1999
C. taino Andrade, 1999
C. targionii (Emery, 1894)
C. texanus (Santschi, 1915)
C. toltecus Andrade, 1999
C. trichophorus Andrade, 1999
C. umbraculatus (Fabricius, 1804)
C. unimaculatus (F. Smith, 1854)
C. ustus (Kempf, 1973)
C. varians (F. Smith, 1876)
C. ventriosus Andrade, 1999*
C. vinosus (W.M. Wheeler, 1936)
C. wheeleri (Forel, 1901)
Procryptocerus adlerzi (Mayr, 1887)
P. attenuatus (F. Smith, 1876)
P. balzani Emery, 1894

P. batesi Forel, 1899
P. belti Forel, 1899
P. carbonarius (Mayr, 1870)
P. clathratus Emery, 1896
P. convergens (Mayr, 1887)
P. convexus Forel, 1904
P. coriarius (Mayr, 1870)
P. curvistriatus Kempf, 1949
P. eladio Longino y Snelling, 2002
P. elegans Santschi, 1921
P. ferreri Forel, 1912
P. gibbosus Kempf, 1949
P. goeldii Forel, 1899
P. gracilis (F. Smith, 1858)
P. hirsutus Emery, 1896
P. hylaeus Kempf, 1951
P. impressus Forel, 1899
P. kempfi Longino y Snelling, 2002
P. lenkoi Kempf, 1969
P. lepidus Forel, 1908
P. marginatus Borgmeier, 1948
P. mayri Forel, 1899
P. montanus Kempf, 1957
P. nalini Longino y Snelling, 2002
P. paleatus Emery, 1896
P. pictipes Emery, 1896
P. regularis Emery, 1888
P. rudis (Mayr, 1870)
P. sampaioi Forel, 1912
P. scabriusculus Forel, 1899
P. schmitti Forel, 1901
P. seabrai Kempf, 1964
P. spiniperdus Forel, 1899
P. striatus (Smith, 1870)
P. subpilosus (Smith, 1860)
P. sulcatus Emery, 1894
P. tortuguero Longino y Snelling, 2002
P. victoris Kempf, 1960
P. virgatus Kempf, 1964

Crematogastrini

Crematogaster abstinens Forel, 1899
C. acuta (Fabricius, 1804)
C. amapaensis Kempf, 1960
C. ampla Forel, 1912
C. arata Emery, 1906
C. arcuata Forel, 1899
C. ashmeadi Mayr, 1886
C. atra Mayr, 1870
C. bingo Forel, 1908
C. boliviana (W.M. Wheeler, 1922)
C. brasiliensis Mayr, 1878
C. brasiliensis arawak Weber, 1938
C. brevidentata Forel, 1912
C. brevispinosa tumulifera faultrix Forel, 1908

C. brevispinosa tumulifera tumulicula Forel, 1909
C. bruchi Forel, 1912
C. bryophilia Longino, 2003
C. californica W.M. Wheeler, 1919
C. carinata Mayr, 1862
C. clydia Forel, 1912
C. corticicola Mayr, 1887
C. corvina Mayr, 1870
C. crinosa Mayr, 1862
C. cristata Santschi, 1929
C. crucis Forel, 1912
C. cubaensis Mann, 1920
C. curvispinosa Mayr, 1862
C. delitescens W.M. Wheeler, 1921
C. depilis W.M. Wheeler, 1919
C. distans Mayr, 1870
C. dorsidens Santschi, 1925
C. egregior Forel, 1912
C. erecta Mayr, 1866
C. euterpe Santschi, 1922
C. evallans Forel, 1907
C. flavomicrops Longino, 2003
C. flavosensitiva Longino, 2003
C. foliocrypta Longino, 2003
C. formosa Mayr, 1870
C. formosa aterrima W.M. Wheeler, 1909
C. goeldii Forel, 1903
C. heathi Mann, 1916
C. hespera Buren, 1968
C. huberi (Forel, 1907)
C. indefensa Kempf, 1968
C. jardinero Longino, 2003
C. iheringi Forel, 1908
C. iheringi bosqi Santschi, 1934
C. iheringi nemesis Santschi, 1934
C. laevis Mayr, 1877
C. laevis bruesi W.M. Wheeler, 1911
C. levior Longino, 2003
C. limata parabiota levior Forel, 1911
C. limata F. Smith, 1858
C. longispina boliviana W.M. Wheeler, 1925
C. longispina Emery, 1890
C. longispina naumannae Forel, 1921
C. lucayana W.M. Wheeler, 1905
C. lucayana etiolata W.M. Wheeler, 1905
C. lutzi florida Forel, 1908
C. lutzi Forel, 1905
C. magnifica Santschi, 1925
C. malevolens Santschi, 1919
C. mancocapaci Santschi, 1911
C. manii Buren, 1968
C. marioni Buren, 1968
C. minutissima Mayr, 1870
C. moelleri Forel, 1912
C. montana Borgmeier, 1939
C. monteverdensis Longino, 2003

C. montezumia Smith, 1858
C. mormonum W.M. Wheeler, 1919
C. nigropilosa Mayr, 1870
C. obscurata Emery, 1895
C. opaca cedrosensis W.M. Wheeler, 1934
C. opaca dentinodis Forel, 1901
C. opaca Mayr, 1870
C. oxygynoides Santschi, 1934
C. parallela Santschi, 1924
C. patei Buren, 1968
C. peristerica Menozzi, 1925
C. peruviana Wheeler, 1922
C. polymnia oeagria Santschi, 1933
C. polymnia Santschi, 1922
C. quadriformis gracilior Forel, 1901
C. quadriformis Roger, 1863
C. quadriformis roveretoi Forel, 1913
C. quadriformis vezenyii Forel, 1907
C. quadrispinosa Roger, 1863
C. raptor Longino, 2003
C. rifleina Buren, 1968
C. rochai Forel, 1903
C. rossi Buren, 1968
C. rudis Emery, 1894
C. russata W.M. Wheeler, 1924
C. russoi Menozzi y Russo, 1930
C. sanguinea atavista Mann, 1920
C. sanguinea Roger, 1863
C. sanguinea sotolongoi Mann, 1920
C. sanguinea torrei W.M. Wheeler, 1913
C. saussurei Forel, 1899
C. scapamaris Santschi, 1922
C. scelerata Santschi, 1917
C. scelerata taperensis Borgmeier, 1937
C. sericea Forel, 1912
C. snellingi Longino, 2003
C. sotobosque Longino, 2003
C. steinheili argentina Forel, 1915
C. steinheili Forel, 1881
C. stigmatica Forel, 1911
C. stollii Forel, 1884
C. subtonsa Santschi, 1925
C. sumichrasti Mayr, 1870
C. tenuicula Forel, 1904
C. thalia Forel, 1911
C. torosa Mayr, 1870
C. torosa chodati Forel, 1921
C. unciata Santschi, 1925
C. uruguayensis Santschi, 1912
C. vicina André, 1893
C. victima aleggrensis Forel, 1901
C. victima cisplatinalis Mayr, 1887
C. victima nitidiceps Emery, 1895
C. victima nitidiceps nana Santschi, 1934
C. victima nitidiceps pergens Forel, 1911
C. victima nitidiceps turbida Santschi, 1925

C. victima Smith, 1858
C. wardi Longino, 2003

Dacetini

Acanthognathus brevicornis M.R. Smith, 1944
A. lentus Mann, 1922
A. ocellatus Mayr, 1887
A. poinari Baroni Urbani, 1994*
A. rudis Brown y Kempf, 1969
A. stipulosus Brown y Kempf, 1969
A. teledectus Brown y Kempf, 1969

Daceton armigerum (Latreille, 1802)

Pyramica aethegenys Bolton, 2000
P. abditivata Bolton, 2000
P. alberti (Forel, 1893)
P. appretiata (Borgmeier, 1954)
P. asaphes Bolton, 2000
P. auctidens Bolton, 2000
P. azteca (Kempf, 1960)
P. beebei (Wheeler, 1915)
P. brevicornis (Mann, 1922)
P. browni Bolton, 2000
P. cassicuspis Bolton, 2000
P. cincinnata (Kempf, 1975)
P. comis (Kempf, 1959)
P. connectens (Kempf, 1958)
P. conspersa (Emery, 1906)
P. convexiceps (Santschi, 1931)
P. crassicornis (Mayr, 1887)
P. crementa Bolton, 2000
P. dapsilis Bolton, 2000
P. decipula Bolton, 2000
P. deinomastax Bolton, 2000
P. denticulata (Mayr, 1887)
P. dentinasis (Kempf, 1960)
P. depressiceps (Weber, 1934)
P. dispalata Bolton, 2000
P. dontopagis Bolton, 2000
P. doryceps Bolton, 2000
P. eggersi (Emery, 1890)
P. electrina (De Anrade, 1994)*
P. emiliae (Forel, 1907)
P. enopla Bolton, 2000
P. epinotalis (Weber, 1934)
P. excisa (Weber, 1934)
P. friderimuelleri (Forel, 1886)
P. furtiva Bolton, 2000
P. gemella (Kempf, 1975)
P. glenognatha Bolton, 2000
P. grytava Bolton, 2000
P. gundlachi Roger, 1862
P. hadrodens Bolton, 2000
P. halosis Bolton, 2000

- P. hyphata* (Brown, 1953)
P. inusitata (Lattke, 1992)
P. jamaicensis (Brown, 1959)
P. kopsomala Bolton, 2000
P. kyidriiformis (Brown, 1964)
P. laevipleura (Kempf, 1958)
P. lalassa Bolton, 2000
P. lilloana (Brown, 1950)
P. longinoi Bolton, 2000
P. lygatrix Bolton, 2000
P. margaritae (Forel, 1893)
P. metopia (Brown, 1959)
P. metrix Bolton, 2000
P. microthrix (Kempf, 1975)
P. minuscula (Kempf, 1962)
P. mirabilis (Mann, 1926)
P. moloch Bolton, 2000
P. myllorhapha (Brown, 1959)
P. necopina Bolton, 2000
P. nigrescens (Weeler, 1911)
P. nitens (Santschi, 1932)
P. nubila (Lattke y Goitía, 1997)
P. orchibia (Brown, 1953)
P. paradoxa Bolton, 2000
P. parsauga Bolton, 2000
P. pasisops Bolton, 2000
P. perissognatha Bolton, 2000
P. pholidota Bolton, 2000
P. prex Bolton, 2000
P. probatrix (Brown, 1964)
P. raptans Bolton, 2000
P. reticeps (Kempf, 1969)
P. rogata Bolton, 2000
P. rugithorax (Kempf, 1959)
P. schleorum (Baroni Urbani, 1994)*
P. schulzi (Emery, 1894)
P. simulans (Santschi, 1931)
P. siagodens Bolton, 2000
P. splendens (Borgmeier, 1954)
P. stauroma Bolton 2000
P. stenotes Bolton, 2000
P. subdentata (Mayr, 1887)
P. sublucida (Brown, 1953)
P. substricta (Kempf, 1964)
P. tanymastax (brown, 1964)
P. thaxteri (Wheeler, 1916)
P. teratrix Bolton, 2000
P. tlaloc Bolton, 2000
P. trieces (Brown, 1960)
P. turpis Bolton, 2000
P. umboceps Bolton, 2000
P. urrhobia Bolton, 2000
P. vartana Bolton, 2000
P. villiersi (Perrault, 1986)
P. warditeras Bolton, 2000
P. wheeleri (M.R. Smith, 1944)
- P. xenocheleyna* Bolton, 2000
P. xenognatha (Kempf, 1958)
P. zeteki (Brown, 1959)
- Strumigenys anthocera* Lattke y Goitía, 1997
S. ascita Bolton, 2000
S. biolleyi Forel, 1908
S. boneti Brown, 1959
S. borgmeieri Brown, 1954
S. calamita Bolton, 2000
S. carinithorax Borgmeier, 1934
S. consanii Brown, 1954
S. cordovenssis Mayr, 1887
S. cosmstela Kempf, 1975
S. cultrigera Mayr, 1887
S. deletrix Bolton, 2000
S. deltisquama Brown, 1957
S. diabola Bolton, 2000
S. diptyxis Bolton, 2000
S. dolichognata Weber, 1934
S. dubitata Bolton, 2000
S. dyseides Bolton, 2000
S. elongata Roger, 1863
S. emmae (Emery, 1890)
S. emeryi Mann, 1922
S. epelys Bolton, 2000
S. eversa Bolton, 2000
S. extirpa Bolton, 2000
S. fairchildi Brown, 1961
S. formicosa Bolton, 2000
S. godmani Forel, 1899
S. gytha Bolton, 2000
S. hemidisca Brown, 1953
S. hindenburgi Forel, 1915
S. humata Lattke y Goitía, 1997
S. idiogenes Bolton, 2000
S. incuba Bolton, 2000
S. infidelis Santschi, 1919
S. insolita Bolton, 2000
S. interfectiva Lattke y Goitía, 1997
S. lacacoca Brown, 1959
S. lanuginosa W.M. Wheeler, 1905
S. longispinosa Brown, 1958
S. ludia Mann, 1922
S. louisianae Roger, 1863
S. mandibularis Smith, 1860
S. manis Bolton, 2000
S. marginiventris Santschi, 1931
S. micretes Brown, 1959
S. mixta Brown, 1953
S. moera Bolton, 2000
S. monstra Bolton, 2000
S. nastata Bolton, 2000
S. nevermanni Brown, 1959
S. oblicua Bolton, 2000
S. ogloblini Santschi, 1936

S. pariensis Lattke y Goitía, 1997
S. perdita Bolton, 2000
S. perparva Brown, 1958
S. planeti Brown, 1953
S. platyscapa Bolton, 2000
S. precava Brown, 1954
S. princeps Kempf y Brown, 1969
S. prospiciens Emery, 1906
S. quadrua Bolton, 2000
S. rehi Forel, 1907
S. rogeri Emery, 1890
S. ruta Bolton, 2000
S. saliens Mayr, 1887
S. sanctipauli Kempf, 1958
S. schmalzi Emery, 1906
S. sevesta Bolton, 2000
S. silvestrii Emery, 1906
S. skia Bolton, 2000
S. smilax Bolton, 2000
S. smithii Forel, 1886
S. spathula Lattke y Goitía, 1997
S. sublonga Brown, 1958
S. tachirensis Lattke y Goitía, 1997
S. thomae Kempf, 1976
S. timicala Bolton, 2000
S. tococae W.M. Wheeler y Bequaert, 1929
S. trinidadensis W.M. Wheeler, 1922
S. trudifera Kempf y Brown, 1969
S. usbensis Lattke y Goitía, 1997
S. vilhenai Bolton, 2000
S. vivax Bolton, 2000
S. xochipili Bolton, 2000

Formicoxenini

Cardiocondyla ectopia Snelling, 1974
C. emeryi Forel, 1881
C. venustula W.M. Wheeler, 1908

Leptothorax andrei Emery, 1895
L. anduzei Weber, 1943
L. argentinus Santschi, 1922
L. asper Mayr, 1887
L. brasiliensis Kempf, 1958
L. brimodus Bolton, 1995
L. clavipilis (W.M. Wheeler, 1910)
L. costatus Emery, 1896
L. echinatinodis Forel, 1886
L. itinerans Kempf, 1959
L. manni W.M. Wheeler, 1914
L. nevadensis Wheeler, 1903
L. obliquicanthus Cole, 1953
L. peninsularis Kempf, 1959
L. pittieri Forel, 1899
L. pleuriticus Wheeler, 1921
L. pulcher Emery, 1917
L. rugatulus Emery, 1895

L. rutilans Kempf, 1958
L. schwebeli Forel, 1913
L. sculptiventris Mayr, 1887
L. spininodis Mayr, 1887
L. stollii Forel, 1885
L. striatulus Stitz, 1937
L. tonsuratus Kempf, 1959
L. tristani Emery, 1896
L. vicinus Mayr, 1887
L. whitfordi MacKay, 2000
L. wilda M.R. Smith, 1943

Grupo *Lenomyrmex*

Lenomyrmex costatus Fernández y Palacio, 1999
L. foveolatus Fernández y Palacio, 1999
L. inusitatus Fernández, 2001
L. mandibularis Fernández y Palacio, 1999
L. wardi Fernández y Palacio, 1999

Metaponini

Xenomyrmex floridanus Emery, 1895
X. floridanus skwarrae W.M. Wheeler, 1931
X. panamanus (W.M. Wheeler, 1922)
X. stollii Forel, 1885

Myrmecini

Myrmecina americana Emery, 1895

Perissomyrmex snyderi M.R. Smith, 1947

Myrmicini

Hylomyrma balzani (Emery, 1894)
H. blandiens Kempf, 1961
H. columbica Forel, 1912
H. dentiloba (Santschi, 1931)
H. longiscapa Kempf, 1961
H. reitteri (Mayr, 1887)

Pogonomyrmex apache W.M. Wheeler, 1902
P. atratus Santschi, 1922
P. barbatus (F. Smith, 1858)
P. bicolor Cole, 1968
P. bispinosus (Spinola, 1851)
P. brevibarbis Emery, 1906
P. brevibarbis niger Santschi, 1925
P. brevibarbis silvestrii Emery, 1906
P. bruchi Forel, 1913
P. californicus Buckley, 1867
P. carbonarius Mayr, 1868
P. carbonarius sanmartini Kusnezov, 1953
P. catanlilensis Gallardo, 1931
P. coarctatus Mayr, 1868

P. cunicularius Mayr, 1887
P. desertorum W.M. Wheeler, 1902
P. guatemaltecus W.M. Wheeler, 1914
P. imberbicus W.M. Wheeler, 1902
P. inermis Forel, 1914
P. laevinodis Snelling, 1982
P. laticeps Santschi, 1922
P. longibarbis andinus Kusnezov, 1951
P. longibarbis Gallardo, 1931
P. magnacanthus Cole, 1968
P. marcus Kusnezov, 1951
P. maricopa W.M. Wheeler, 1914
P. mayri Forel, 1899
P. meridionalis Kusnezov, 1951
P. meridionalis leonis Kusnezov, 1951
P. micans Forel, 1914
P. montanus MacKay, 1980
P. pima W.M. Wheeler, 1909
P. pronotalis Santschi, 1922
P. rastratus Mayr, 1868
P. rastratus pulchellus Santschi, 1925
P. rugosus Emery, 1895
P. snellingi Taber, 1998
P. striatinodus Fernández y Palacio, 1997
P. subnitidus Emery, 1895
P. sylvestris Lattke, 1990
P. tenuispinus Forel, 1914
P. theresiae Forel, 1899
P. uruguayensis Mayr, 1887
P. variabilis Santschi, 1916
P. vermiculatus Emery, 1906
P. vermiculatus chubutensis Forel, 1913
P. wheeleri Olsen, 1934

Ochetomyrmecini

Ochetomyrmex semipolitus Mayr, 1878
O. neopolitus Fernández, 2003

Tranopelta gilva Mayr, 1866
T. subterranea (Mann, 1916)

Phalacromyrmecini

Phalacromyrmex fugax Kempf, 1960

Pheidolini

Aphaenogaster araneoides Emery, 1890
A. araneoides canalis Enzmann, 1947
A. araneoides inermis Forel, 1899
A. araneoides nitidiventris Forel, 1912
A. ensifera Forel, 1899
A. honduriana Mann, 1922
A. mexicana (Pergande, 1896)
A. phalangium Emery, 1890
A. phalangium brevicollis Forel, 1899

Messor andrei Mayr, 1886
M. julianus (Pergande, 1894)
M. pergandei Mayr, 1886
M. stoddardi Emery, 1895

Pheidole aberrans Mayr, 1868
P. absurda Forel, 1886
P. accinota W.M. Wheeler, 1925
P. aciculata Wilson, 2003
P. ademonia Wilson, 2003
P. alacris Santschi, 1923
P. agricola Wilson, 2003
P. albipes Wilson, 2003
P. alexeter Wilson, 2003
P. alfaro Emery, 1896
P. allarmata Wilson, 2003
P. alpestris Wilson, 2003
P. alpinensis Forel, 1912
P. alticola Wilson, 2003
P. amabilis Wilson, 2003
P. amata Forel, 1901
P. amazonica Wilson, 2003
P. ambigua Wilson, 2003
P. androsana Wheeler, 1905
P. angulifera Wilson, 2003
P. angusta Forel, 1908
P. angusticeps Wilson, 2003
P. anima Wilson, 2003
P. antillana Forel, 1893
P. aper Forel, 1912
P. arachnion Wilson, 2003
P. arboricola Wilson, 2003
P. arctos Wilson, 2003
P. arhuaca Forel, 1901
P. ariel Wilson, 2003
P. arietans Wilson, 2003
P. aripoensis Wilson, 2003
P. asperithorax Emery, 1894
P. astur Wilson, 2003
P. atticola Forel, 1912
P. auropilosa Mayr, 1887
P. avia Forel, 1908
P. azteca Wilson, 2003
P. bakeri Forel, 1912
P. balzani Emery, 1894
P. bambusarum Forel, 1908
P. bellatrix Wilson, 2003
P. belocephus Wilson, 2003
P. biconstricta Mayr, 1870
P. bicornis Forel, 1899
P. bidens Wilson, 2003
P. bilimeki Mayr, 1870
P. binasifer Wilson, 2003
P. biolleyi Forel, 1908
P. bison Wilson, 2003
P. blumenauensis Wilson, 2003



- P. boliviana* Wilson, 2003
P. boltoni Wilson, 2003
P. borgmeieri Kempf, 1972
P. boruca Wilson, 2003
P. brachyops Wilson, 2003
P. brandaoi Wilson, 2003
P. brevicona Mayr, 1887
P. breviscapa Forel, 1899
P. breviseta Santschi, 1919
P. browni Wilson, 2003
P. bruchella Forel, 1915
P. bruesi Wheeler, 1917 Revisar
P. brunnescens Santschi, 1929
P. bucculenta Forel, 1908
P. bulliceps Wilson, 2003
P. calens Forel, 1901
P. calimana Wilson, 2003
P. cameroni Mayr, 1887
P. camilla Wilson, 2003
P. camptostela Kempf, 1972
P. capillata Emery, 1906
P. caracalla Wilson, 2003
P. carapuna Mann, 1916
P. carapunco Kusnezov, 1952
P. cardiella Wilson, 2003
P. carinata Wilson, 2003
P. cataphracta Wilson, 2003
P. cataractae W.M. Wheeler, 1916
P. caulicola Wilson, 2003
P. cavifrons Wilson, 2003
P. ceibana Wilson, 2003
P. celaena Wilson, 2003
P. centeotl Wilson, 2003
P. cephalica Wilson, 2003
P. cerebresioi W.M. Wheeler, 1919
P. cerina Wilson, 2003
P. chalca Wheeler, 1914
P. chalcoides Wilson, 2003
P. charazana Wilson, 2003
P. chilensis Mayr, 1862
P. chloe Forel, 1908
P. christopherseni Forel, 1912
P. chrysops Wilson, 2003
P. cielana Wilson, 2003
P. citrina Wilson, 2003
P. claviscapa Santschi, 1925
P. cocciphaga Borgmeier, 1934
P. coffeicola Wilson, 2003
P. colobopsis Mann, 1916
P. coracina Wilson, 2003
P. cornicula Wilson, 2003
P. coveri Wilson, 2003
P. cramptoni W.M. Wheeler, 1916
P. crinita Wilson, 2003
P. crozieri Wilson, 2003
P. cubaensis Mayr, 1862
P. cuprina Wilson, 2003
P. cyrtostela Wilson, 2003
P. daphne Wilson, 2003
P. dasypyx Wilson, 2003
P. davidsonae Wilson, 2003
P. davisii W.M. Wheeler, 1915
P. deceptrix Forel, 1899
P. defecta Santschi, 1923
P. delicata Wilson, 2003
P. demeter Wilson, 2003
P. descolei Kusnezov, 1952
P. diabolus Wilson, 2003
P. diana Forel, 1908
P. diligens F. Smith, 1858
P. dinophila Wilson, 2003
P. dione Forel, 1913
P. dorsata Wilson, 2003
P. drepanon Wilson, 2003
P. dryas Wilson, 2003
P. dunicola Wilson, 2003
P. dwyeri Gregg, 1969
P. dyctiota Kempf, 1972
P. ebenina Wilson, 2003
P. ectatommoides Wilson, 2003
P. ecuadorana Wilson, 2003
P. embolopyx Brown, 1968
P. eparamata Wilson, 2003
P. erethizon Wilson, 2003
P. eriophora Wilson, 2003
P. erratilis Wilson, 2003
P. erwini Wilson, 2003
P. euryscopa Wilson, 2003
P. exarata Emery, 1896
P. excubitor Wilson, 2003
P. exigua Mayr, 1884
P. exquisita Wilson, 2003
P. fabricator F. Smith, 1858
P. fariasana Wilson, 2003
P. fera Santschi, 1925
P. fimbriata Roger, 1863
P. fissiceps Wilson, 2003
P. flavens Roger, 1863
P. flavida Mayr, 1887
P. flavifrons Wilson, 2003
P. floricola Wilson, 2003
P. fowleri Wilson, 2003
P. fracticeps Wilson, 2003
P. fullerae Wilson, 2003
P. gagates Wilson, 2003
P. gagei Forel, 1914
P. gangamon Wilson, 2003
P. gauthieri Forel, 1901
P. geminata Wilson, 2003
P. gemmula Wilson, 2003
P. geraesensis Santschi, 1929
P. germaini Emery, 1896

- P. gertrudae* Forel, 1886
P. gibba Mayr, 1887
P. gibbata Borgmeier, 1934
P. gigaflavens Wilson, 2003
P. gilva Wilson, 2003
P. glyphoderma Wilson, 2003
P. globularia Wilson, 2003
P. glomericeps Wilson, 2003
P. gnomus Wilson, 2003
P. godmani Forel, 1893
P. goeldii Forel, 1896
P. gradifer Wilson, 2003
P. grandinodus Wilson, 2003
P. grantae Forel, 1908
P. grvida Wilson, 2003
P. grex Wilson, 2003
P. guajirana Wilson, 2003
P. guayasana Wilson, 2003
P. guerrerana Wilson, 2003
P. guilelmimuelleri Forel, 1886
P. harlequina Wilson, 2003
P. hasticeps Wilson, 2003
P. hecate W.M. Wheeler, 1911
P. hermosa Wilson, 2003
P. heterothrix Wilson, 2003
P. hetschkoi Santschi, 1923
P. heyeri Forel, 1899
P. hierax Wilson, 2003
P. hispaniolae Wilson, 2003
P. hirtula Forel, 1899
P. hizemops Wilson, 2003
P. hoelldobleri Wilson, 2003
P. horribilis Wilson, 2003
P. hortonae Wilson, 2003
P. huilana Wilson, 2003
P. humida Wilson, 2003
P. inca Wilson, 2003
P. incisa Mayr, 1870
P. indistincta Forel, 1899
P. inermis Wilson, 2003
P. infernalis Wilson, 2003
P. inversa Forel, 1901
P. iracunda Wilson, 2003
P. jeannei Wilson, 2003
P. jivaro Wilson, 2003
P. kuna Wilson, 2003
P. laelaps Wilson, 2003
P. laevifrons Mayr, 1887
P. laevinota Forel, 1908
P. laidlowi Mann, 1916
P. laevifrons Mayr, 1887
P. laevinota Forel, 1908
P. laselva Wilson, 2003
P. laticrista Santschi, 1916
P. laticornis Wilson, 2003
P. laudatana Wilson, 2003
P. lemnisca Wilson, 2003
P. lemur Forel, 1912
P. lignicola Mayr, 1887
P. lilloi Kusnezov, 1952
P. longinoi Wilson, 2003
P. longior Santschi, 1933
P. longiscapa Forel, 1901
P. longiseta Wilson, 2003
P. lucaris Wilson, 2003
P. lustrata Wilson, 2003
P. lutzi Forel, 1905
P. machetula Wilson, 2003
P. mackayi Wilson, 2003
P. mallota Wilson, 2003
P. mamore Mann, 1916
P. manuana Wilson, 2003
P. medialis Wilson, 2003
P. megacephala (Fabricius, 1793)
P. meinerti Forel, 1905
P. meinertopsis Wilson, 2003
P. melastomae Wilson, 2003
P. mendicula W.M. Wheeler, 1925
P. metana Wilson, 2003
P. micana Wilson, 2003
P. micon Wilson, 2003
P. micridis Wilson, 2003
P. minensis Santschi, 1923
P. minutula Mayr, 1878
P. mirabilis Wilson, 2003
P. mittermeieri Wilson, 2003
P. mixteca Wilson, 2003
P. moerens Wheeler, 1908
P. moffetti Wilson, 2003
P. monteverdensis Wilson, 2003
P. morelosana Wilson, 2003
P. moseni W.M. Wheeler, 1925
P. mosenopsis Wilson, 2003
P. multispina Wilson, 2003
P. nana Emery, 1894
P. napoensis Wilson, 2003
P. nasifer Wilson, 2003
P. nasutoides Hölldobler y Wilson, 1992
P. nebulosa Wilson, 2003
P. neolongiceps Brown, 1950
P. nigella Emery, 1894
P. nigricula Wilson, 2003
P. nitella Wilson, 2003
P. nitidicollis Emery, 1896
P. nitidula Emery, 1888
P. noar Wilson, 2003
P. nubila Emery, 1906
P. nubicola Wilson, 2003
P. nubila Wilson, 2003
P. oaxacana Wilson, 2003
P. obnixa Forel, 1912
P. obrima Wilson, 2003



- P. obscurifrons* Santschi, 1925
P. obtusopilosa Mayr, 1887
P. obtusospinosa Pergande, 1886
P. olsoni Wilson, 2003
P. onyx Wilson, 2003
P. orbica Forel, 1893
P. otisi Wilson, 2003
P. oxyops Forel, 1908
P. palenquensis Wilson, 2003
P. pampana Santschi, 1929
P. pariana Wilson, 2003
P. peckorum Wilson, 2003
P. pedana Wilson, 2003
P. peltastes Wilson, 2003
P. pepo Wilson, 2003
P. perdiligens Wilson, 2003
P. peregrina Wheeler, 1916
P. perkinsi Wilson, 2003
P. perpusilla Emery, 1894
P. peruviana Wilson, 2003
P. petersoni Wilson, 2003
P. pholeops Wilson, 2003
P. piceonigra Emery, 1922
P. pidax Wilson, 2003
P. pilifera Roger, 1863
P. pilispina Wilson, 2003
P. pinealis W.M. Wheeler, 1908
P. pinicola Wilson, 2003
P. plato Wilson, 2003
P. polita Emery, 1894
P. polymorpha Wilson, 2003
P. praeses Wilson, 2003
P. pratorum Wilson, 2003
P. primigenia Baroni Urbani, 1995*
P. prolixa Wilson, 2003
P. prostrata Wilson, 2003
P. psammophila Creighton y Gregg, 1955
P. pubiventris Mayr, 1887
P. pugnax Dalla Torre, 1892
P. pullula Santschi, 1911
P. punctatissima Mayr, 1870
P. pygmaea Wilson, 2003
P. quadriceps Wilson, 2003
P. quercicola Wilson, 2003
P. quiaccana Wheeler, 1925
P. radoszkowskii Mayr, 1884
P. rectiluma Wilson, 2003
P. rectisentis Wilson, 2003
P. rectispina Wilson, 2003
P. rectitrudis Wilson, 2003
P. reichenspergeri Santschi, 1923
P. renae Wilson, 2003
P. rhea W.M. Wheeler, 1908
P. rhinoceros Forel, 1899
P. rhytifera Wilson, 2003
P. risii Forel, 1892
P. riveti Santschi, 1911
P. rogeri Emery, 1896
P. rochai Forel, 1912
P. rosae Forel, 1901
P. rosula Wilson, 2003
P. rotundiceps Wilson, 2003
P. rudigenis Emery, 1906
P. rufipilis Forel, 1908
P. rugatula Santschi, 1933
P. rugiceps Wilson, 2003
P. ruida Wilson, 2003
P. rutilana Wilson, 2003
P. sabella Wilson, 2003
P. sabina Wilson, 2003
P. sagana Wheeler, 1934
P. sagax Wilson, 2003
P. sagittaria Wilson, 2003
P. sarcina Forel, 1912
P. sarpedon Wilson, 2003
P. scabriventris Wilson, 2003
P. scalaris Wilson, 2003
P. schmalzi Emery, 1894
P. schwarzmaieri Borgmeier, 1939
P. scimitarra Wilson, 2003
P. sciophila W.M. Wheeler, 1908
P. scitula Wilson, 2003
P. scolioceps Wilson, 2003
P. scrobifera Emery, 1896
P. sculptior Forel, 1893
P. securiger Wilson, 2003
P. seeldrayersi Farel, 1910
P. seligmanni Wilson, 2003
P. senilis Santschi, 1929
P. sensitiva Borgmeier, 1959
P. servilia Wilson, 2003
P. setsukoa Wilson, 2003
P. sicaria Wilson, 2003
P. sierra Wilson, 2003
P. sigillata Wilson, 2003
P. similigena W.M. Wheeler, 1937
P. simonsi Wilson, 2003
P. simplex W.M. Wheeler, 1925
P. soritis W.M. Wheeler, 1908
P. spadonia W.M. Wheeler, 1915
P. spathicornis Wilson, 2003
P. specularis Wilson, 2003
P. sphaerica Wilson, 2003
P. spilita Wilson, 2003
P. spininodis Mayr, 1887
P. socrates Forel, 1912
P. sospes Forel, 1908
P. steinheili Forel, 1901
P. stigma Wilson, 2003
P. stomachosa Wheeler, 1917
P. striaticeps Mayr, 1870
P. strigosa Wilson, 2003

P. stulta Forel, 1886
P. subaberrans Kusnezov, 1952
P. subarmata Mayr, 1884
P. subnuda Wilson, 2003
P. subsphaerica Wilson, 2003
P. superba Wilson, 2003
P. synarmata Wilson, 2003
P. tachigaliae Wheeler, 1921
P. tachirana Wilson, 2003
P. tambopatae Wilson, 2003
P. tanyscapa Wilson, 2003
P. tarchon Wilson, 2003
P. taurus Emery, 1906
P. tayrona Wilson, 2003
P. tenebra Wilson, 2003
P. tenerescens Wheeler, 1922
P. teneriffana Forel, 1893
P. tennantae Wilson, 2003
P. tenuis Wilson, 2003
P. tepicana Pergande, 1896
P. tepuicola Wilson, 2003
P. termitobia Forel, 1901
P. terresi Wheeler y Mann, 1914
P. terribilis Wilson, 2003
P. tethepa Wilson, 1985*
P. tetrica Forel, 1913
P. texticeps Wilson, 2003
P. tigris Wilson, 2003
P. tillandsiarum Wheeler, 1934
P. tisiphone Wheeler, 1911
P. titanis W.M. Wheeler, 1903
P. torosa Wilson, 2003
P. trachyderma Emery, 1906
P. tragica W.M. Wheeler, 1934
P. transversostriata Mayr, 1887
P. triconstricta Forel, 1886
P. trinitatis Wilson, 2003
P. tristicula Wilson, 2003
P. tristis (F. Smith, 1858)
P. tristops Wilson, 2003
P. triumbonata Wilson, 2003
P. truncula Wilson, 2003
P. tschinkeli Wilson, 2003
P. tuxtlasana Wilson, 2003
P. tysoni Wilson, 2003
P. ulothrix Wilson, 2003
P. umphreyi Wilson, 2003
P. unicornis Wilson, 2003
P. ursus Mayr, 1870
P. vafella W.M. Wheeler, 1925
P. vafra Santschi, 1923
P. vallifica Forel, 1901
P. variceps Wilson, 2003
P. vaslitii Pergande, 1896
P. veletis Wilson, 2003
P. venatrix Wilson, 2003

P. verricula Wilson, 2003
P. vestita Wilson, 2003
P. victima Wilson, 2003
P. viriosa Wilson, 2003
P. violacea Wilson, 2003
P. veletis Wilson, 2003
P. vomer Wilson, 2003
P. walkeri Mann, 1922
P. wardi Wilson, 2003
P. weiseri Santschi, 1923
P. williamsi W.M. Wheeler, 1919
P. xerophila W.M. Wheeler, 1908
P. xyston Wilson, 2003
P. yucatanica Wilson, 2003
P. zelata Wilson, 2003
P. zeteki M.R. Smith, 1947
P. zoster Wilson, 2003

Pheidologetonini

Carebara anophthalma (Emery, 1906)
C. bicarinata Santschi, 1912
C. bruchi (Santschi, 1933) = *Oligomyrmex bruchi* Santschi [Fernández, en evaluación]
C. incerta Santschi, 1923
C. longiceps (Santschi, 1929) = *Oligomyrmex longiceps* Santschi [Fernández, en evaluación]
C. mayri Forel, 1901
C. panamensis (W.M. Wheeler, 1925) = *Oligomyrmex panamensis* W.M. Wheeler [Fernández, en evaluación]
C. peruviana (Emery, 1906) = *Oligomyrmex peruvianus* Emery [Fernández, en evaluación]
C. stenoptera (Kusnezov, 1952) = *Oligomyrmex stenopterus* Kusnezov [Fernández, en evaluación]
C. urichi (W.M. Wheeler, 1922) = *Oligomyrmex urichi* (W.M. Wheeler) [Fernández, en evaluación]
C. winifredae W.M. Wheeler, 1922

Oxydrit antillana Wilson, 1985*

Solenopsidini

Allomerus decemarticulatus Mayr, 1878
A. decemarticulatus novemarticulatus W.M. Wheeler y Mann, 1942
A. octoarticulatus Mayr, 1878
A. octoarticulatus angulatus W.M. Wheeler y Mann, 1942
A. octoarticulatus demerarae W.M. Wheeler, 1942
A. octoarticulatus exsanguis W.M. Wheeler y Mann, 1942
A. octoarticulatus melanoticus W.M. Wheeler y Mann, 1942
A. octoarticulatus septemarticulatus Mayr, 1878
A. octoarticulatus tuberculatus Forel, 1912

Megalomyrmex balzani Emery, 1894
M. bituberculatus (Fabricius, 1798)
M. drifti Kempf, 1961



- M. emeryi* Forel, 1904
M. foreli Emery, 1890
M. glaesarius Kempf, 1970
M. gnomus Kempf, 1970
M. goeldii Forel, 1912
M. incisus M.R. Smith, 1947
M. iheringi Forel, 1911
M. latreillei Emery, 1890
M. leoninus Forel, 1885
M. modestus Emery, 1896
M. myops Santschi, 1925
M. pusillus Forel, 1912
M. silvestrii W.M. Wheeler, 1909
M. staudingeri Emery, 1890
M. symmetochus W.M. Wheeler, 1925
M. wallacei Mann, 1916
M. weyrauchi Kempf, 1970
- Monomorium bicolor* (Ettershank, 1965) = *Nothidris bicolor* Ettershank [Fernández, en preparación]
M. bidentatus Mayr, 1887
M. brasiliense Forel, 1908
M. cekalovici (Snelling, 1975) = *Nothidris cekalovici* Snelling [Fernández, en preparación]
M. carbonarium Fr. Smith, 1858
M. cyaneum W.M. Wheeler, 1914
M. denticulatus Mayr, 1997
M. destructor (Jerdon, 1851)
M. ebeninum Forel, 1891
M. ergatogyna W.M. Wheeler, 1904
M. floricola (Jerdon, 1851)
M. latastei Emery, 1895 = *Nothidris latastei* (Emery) [Fernández, en preparación]
M. minimum (Buckley, 1867)
M. monomorium Bolton, 1987
M. pharaonis (Linnaeus, 1758)
M. salomonis (Linnaeus, 1758)
M. subopacum F. Smith, 1858
M. subcoecum Emery, 1894
- Oxyepoecus bruchi* Santschi, 1926
O. daguerrei (Santschi, 1933)
O. inquilinus (Kusnezov, 1952)
O. mandibularis (Emery, 1913)
O. punctifrons (Borgmeier, 1928)
O. rastratus (Mayr, 1887)
O. vezenyii (Forel, 1907)
- Solenopsis albidula* Emery, 1905
S. albidula flava Santschi, 1929
S. albidula postbrunnea Forel, 1913
S. altinodis Forel, 1912
S. alvarengai (Kempf, 1975) = *Carebarella alvarengai* Kempf [MacKay *et al*, en preparación]
S. amblychila Wheeler, 1915
S. amica Menozzi, 1936
- S. andina* Santschi, 1923
S. angulata carettei Forel, 1913
S. angulata dolichops Emery, 1905
S. angulata Emery, 1894
S. angulata huasanensis Forel, 1912
S. angulata mendozensis Forel, 1914
S. angulata nigelloides Forel, 1913
S. aurea Wheeler, 1906
S. azteca Forel, 1893
S. azteca pallida Wheeler, 1908
S. basalis Forel, 1896
S. basalis major Forel, 1913
S. basalis oculatior Forel, 1913
S. basalis raptor Santschi, 1919
S. basalis urichi Forel, 1912
S. basalis vittata Forel, 1912
S. bicolor (Emery, 1925) = *Carebarella bicolor* Emery [MacKay *et al*, en preparación].
S. brasiliana Santschi, 1925
S. brevicornis Emery, 1888
S. brevicornis medioclara Santschi, 1923
S. brevicornis petropolitana Borgmeier, 1928
S. brevipes Emery, 1906
S. bruchiella Emery, 1922
S. brucki kempf, 1973
S. castor Forel, 1893
S. clytemnestra bruchi Forel, 1912
S. clytemnestra Emery, 1896
S. clytemnestra leda Forel, 1913
S. clytemnestra orestes Forel, 1903
S. clytemnestra strangulata Forel, 1913
S. condei (Borgmeier, 1937) = *Carebarella condei* Borgmeier [MacKay *et al*, en preparación].
S. conjurata W.M. Wheeler, 1925
S. corticalis amazonensis Forel, 1904
S. corticalis binotata Mann, 1920
S. corticalis Forel, 1881
S. corticalis margotae Forel, 1908
S. corticalis virgula Forel, 1904
S. daguerrei (Santschi, 1930)
S. decipiens Emery, 1905
S. decipiens abjecta Emery, 1906
S. decipiens abjecta abjectior Forel, 1909
S. decipiens scelestia Forel, 1908
S. dysderces Snelling, 1975
S. egregia (Kusnezov, 1953)
S. eximia (Kusnezov, 1953)
S. franki Forel, 1908
S. franki idae Forel, 1908
S. gallardoi Santschi, 1925
S. gayi (Spinola, 1851)
S. gayi bruesi Creighton, 1930
S. geminata (Fabricius, 1804)
S. germaini Emery, 1895
S. globularia (Smith, 1858)
S. globularia lucayensis W.M. Wheeler, 1908

S. globularia pacifica W.M. Wheeler, 1919
S. globularia steinheili Forel, 1881
S. goeldii Forel, 1912
S. granivora Kusnezov 1957
S. hammari carhuensis Forel, 1912
S. hammari Mayr, 1903
S. hayemi Forel, 1908
S. helena Emery, 1895
S. helena hermione W.M. Wheeler, 1921
S. helena ultrix W.M. Wheeler, 1921
S. hostilis (Borgmeier, 1959)
S. interrupta Santschi, 1916
S. invicta Buren, 1972
S. iheringi Forel, 1908
S. joergenseni Santschi, 1919
S. joergenseni cuspsior Santschi, 1923
S. joergenseni edentula Santschi, 1933
S. laeviceps antoniensis Forel, 1912
S. laeviceps Mayr, 1870
S. latastei Emery, 1895
S. latastei masora Forel, 1912
S. leptanilloides Santschi, 1925
S. loretana Santschi, 1936
S. macdonaghi Santschi, 1916
S. macrops Santschi, 1917
S. megergates Trager, 1991
S. metanotalis argus Santschi, 1923
S. metanotalis Emery, 1896
S. metanotalis emiliae Santschi, 1912
S. metanotalis pelotana Forel, 1912
S. metanotalis picturata Santschi, 1931
S. metanotalis shiptoni Forel, 1914
S. metanotalis steigeri Santschi, 1916
S. metatarsalis (Kusnezov, 1957)
S. minutissima Emery, 1906
S. molesta (Say, 1836)
S. nigella Emery, 1888
S. nigella gensterblumi Forel, 1901
S. novemmaculata W.M. Wheeler, 1925
S. oculata Santschi, 1925
S. parabiatica Weber, 1943
S. parva Mayr, 1868
S. patagonica Emery, 1905
S. patagonica medeis Forel, 1912
S. photophila Santschi, 1923
S. picea Emery, 1896
S. picea reducta Menozzi, 1927
S. picea subadpressa Forel, 1903
S. picquarti Forel, 1899
S. pollux Forel, 1893
S. pusillignis Trager, 1991
S. pygmaea Forel, 1901
S. pythia Santschi, 1934
S. quinquecuspis Forel, 1913
S. reichenspergeri Santschi, 1923
S. richteri Forel, 1909

S. rugiceps Mayr, 1870
S. saevissima (F. Smith, 1855)
S. schilleri Santschi, 1923
S. schmalzi flaveolens Forel, 1901
S. schmalzi Forel, 1901
S. sea (Kusnezov, 1953)
S. silvestrii Emery, 1906
S. solenopsidis (Kusnezov, 1954)
S. spei Forel, 1912
S. stricta Emery, 1896
S. stricta foederata Santschi, 1923
S. substituta Santschi, 1925
S. subtilis Emery, 1896
S. succinea Emery, 1890
S. succinea nicai Forel, 1913
S. sulfurea (Roger, 1862)
S. tenuis Mayr, 1878
S. tenuis delfinoi Forel, 1913
S. tenuis minuiscens Forel, 1912
S. terricola Menozzi, 1931
S. tetracantha Emery, 1906
S. tetracantha videns Forel, 1912
S. tridens Forel, 1911
S. tridens lehmannitschei Santschi, 1916
S. trihasta Santschi, 1923
S. wasmannii Emery, 1894
S. wasmannii transformis Forel, 1911
S. weiseri Forel, 1914
S. westwoodi Forel, 1894
S. westwoodi atticola Forel, 1912
S. westwoodi platensis Emery, 1906
S. weyreauchi Trager, 1994
S. xyloni MacCook, 1879
S. zeteki Wheeler, 1942

Stegomyrmecini

Stegomyrmex connectens Emery, 1912
S. manni M.R. Smith, 1946

Stenammini

Bariamyrma hispidula Lattke, 1990

Lachnomyrmex haskinsi M.R. Smith, 1944
L. pilosus Weber, 1950
L. plaumanni Borgmeier, 1957
L. scrobiculatus W.M. Wheeler, 1910

Rogeria belti Mann, 1922
R. blanda (F. Smith, 1858)
R. bruchi Santschi, 1922
R. brunnea Santschi, 1930
R. caraiba Santschi, 1936
R. cubensis Santschi, 1936
R. cubensis habanica Santschi, 1936



R. curvipubens Emery, 1894
R. foreli Emery, 1894
R. foreli gaigei Forel, 1914
R. germani Emery, 1894
R. inermis Mann, 1922
R. lacertosa Kempf, 1963
R. micromma Kempf, 1961
R. minensis Santschi, 1923
R. minima Kusnezov, 1958
R. pellecta Kempf, 1963
R. procera Emery, 1896
R. scabra Weber, 1934
R. scandens (Mann, 1922)
R. sicaria Kempf, 1962
R. subarmata (Kempf, 1961)
R. tonduzi Forel, 1899

Stenammina californicum Snelling, 1973
S. diecki Emery, 1895

Subfamilia Ponerinae

Amblyoponini

Amblyopone agostii Lacau y Delabie, 2002
A. armigera Mayr, 1887
A. bierigi (Santschi, 1930)
A. chilensis Mayr, 1887
A. cleae Delabie, 2002
A. degenerata Borgmeier, 1957
A. egregia (Kusnezov, 1955)
A. elongata (Santschi, 1912)
A. falcata Lattke, 1991
A. heraldoi Lacau y Delabie, 2002
A. lurilabes Lattke, 1991
A. monrosi Brown, 1960
A. mystriops Brown, 1960
A. orizabana Brown, 1960

Paraprionopelta minima Kusnezov, 1955

Prionopelta amabilis Borgmeier, 1949
P. antillana Forel, 1909
P. marthae Forel, 1909
P. modesta Forel, 1909
P. punctulata Mayr, 1866

Ectatommini

Acanthoponera goeldii Forel, 1912
A. minor Forel, 1899
A. mucronata (Roger, 1860)
A. peruviana Brown, 1958

S. diversum Mann, 1922
S. expositum M.R. Smith, 1962
S. felixi Mann, 1922
S. heathi W.M. Wheeler, 1915
S. manni W.M. Wheeler, 1914
S. schmidti Menozzi, 1931
S. snellingi Bolton, 1995

Tetramoriini

Tetramorium caespitum (Linnaeus, 1758)
T. guineense (Bernard, 1953)
T. lucayanum Wheeler, 1905
T. spinosum (Pergande, 1896)

Myrmicinae incertae sedis:

Ilemomyrmex caecus Wilson, 1985*

Ectatomma confine Mayr, 1870
E. edentatum Roger, 1863
E. gibbum Kugler y Brown, 1982
E. goninion Kugler y Brown, 1982
E. lugens Emery, 1894
E. muticum Mayr, 1870
E. opaciventre Roger, 1861
E. permagnum Forel, 1908
E. planidens Borgmeier, 1939
E. quadridens (Fabricius, 1793)
E. ruidum Roger, 1860
E. suzanae Almeida, 1986
E. tuberculatum (Olivier, 1792)

Gnamptogenys acuminata Emery, 1896
G. acuta (Brown, 1956)
G. alfaroi Emery, 1894
G. ammophila Lattke, 1990
G. andina Lattke, 1995
G. annulata Mayr, 1887
G. banksi (W.M. Wheeler, 1930)
G. biquetra Lattke, 2002
G. bispinosa (Emery, 1890)
G. bisulca Kempf y Brown, 1968
G. bruchi (Santschi, 1922)
G. boliviensis Lattke, 1995
G. bruchi (Santschi, 1922)
G. brunnea Lattke, 1995
G. brunoi Lattke, 2002*

G. bufonis (Mann, 1926)
G. caelata Kempf, 1967
G. casca Lattke, 2002*
G. concinna (F. Smith, 1858)
G. continua Mayr, 1887
G. cuneiforma Lattke, 1995
G. curvoclypeata Lattke, 1990
G. ejuncida Lattke, 1995
G. ericae Forel, 1912
G. extra Lattke, 1995
G. falcaria Lattke, 2002
G. falcifera Kempf, 1967
G. fernandezi Lattke, 1990
G. fieldi Lattke, 1990
G. gentryi Lattke, 1995
G. gracilis (Santschi, 1929)
G. laticephala Lattke, 1995
G. haenschi Emery, 1902
G. hartmanni (W.M. Wheeler, 1905)
G. haytiana (W.M. Wheeler y Mann, 1914)
G. horni Santschi, 1929
G. ilimani Lattke, 1995
G. ingeborgae Brown, 1993
G. insularis Lattke, 2002
G. interrupta Mayr, 1887
G. kempfi Lenko, 1964
G. lanei Kempf, 1960
G. lavra Lattke, 2002
G. levinates Baroni Urbani, 1980*
G. lineolata Brown, 1992
G. lucaris Kempf, 1968
G. mecotyle Brown, 1958
G. mediatrix Brown, 1958
G. menozzii (Borgmeier, 1928)
G. mina (Brown, 1956)
G. minuta (Emery, 1896)
G. moelleri (Forel, 1912)
G. mordax (F. Smith, 1858)
G. nana Kempf, 1960
G. nigrivitreata Lattke, 1995
G. perspicax Kempf y Brown, 1970
G. petiscapa Lattke, 1990
G. pilosa Lattke, 1995
G. pittieri Lattke, 1990
G. pleurodon (Emery, 1896)
G. porcata (Emery, 1896)
G. pristina Baroni Urbani, 1980*
G. rastrata (Mayr, 1866)
G. regularis Mayr, 1870
G. reichenspergeri (Santschi, 1929)
G. relictata (Mann, 1916)
G. rimulosa (Roger, 1861)
G. rumba Lattke, 2002
G. schmitti (Forel, 1901)
G. semiferox Brown, 1958

G. siapensis Lattke, 1995
G. simplicoides (Forel, 1908)
G. simulans (Emery, 1896)
G. stellae Lattke, 1995
G. striatula Mayr, 1884
G. striolata (Borgmeier, 1957)
G. strigata (Norton, 1871)
G. sulcata (Fr. Smith, 1858)
G. tortuolosa (Fr. Smith, 1858)
G. transversa Lattke, 1995
G. triangularis Mayr, 1887
G. volcano Lattke, 1995
G. vriesi Brandão y Lattke, 1990

Heteroponera angulata Borgmeier, 1959
H. carinifrons Mayr, 1887
H. dentinodis (Mayr, 1887)
H. dolo (Roger, 1861)
H. flava Kempf, 1962
H. georgesii Perrault, 1998
H. inca Brown, 1958
H. inermis (Emery, 1894)
H. mayri Kempf, 1962
H. microps Borgmeier, 1957
H. minuta Kusnezov, 1954
H. monticola Kempf y Brown, 1970
H. panamensis (Forel, 1899)
H. robusta Kempf, 1962

Paraponerini

Paraponera clavata (Fabricius, 1775)
P. dieteri Baroni Urbani, 1994*

Platythyreini

Platythyrea angusta Forel, 1901
P. exigua Kempf, 1964
P. pilosula (F. Smith, 1858)
P. prizo Kugler, 1977
P. punctata (Fr. Smith, 1858)
P. sinuata (Roger, 1860)
P. strenua Wheeler y Mann, 1914
P. zodion Brown, 1975

Proceratiini

Discothyrea denticulata Weber, 1939
D. horni Menozzi, 1927
D. humilis Weber, 1939
D. icta Weber, 1939
D. isthmica Weber, 1940
D. neotropica Bruch, 1919
D. sexarticulata Borgmeier, 1954
D. testacea Roger, 1863



Proceratium brasiliense Borgmeier, 1959
P. denticulatum Lattke, 1991*
P. goliath Kempf y Brown, 1968
P. micrommatum (Roger, 1863)
P. silaceum Roger, 1863
P. tio Snelling y Cover, 1992

Ponerini

Anochetus altisquamis Mayr, 1887
A. ambiguus de Andrade, 1994*
A. bispinosus (F. Smith, 1858)
A. brevidentatus MacKay, 1991*
A. conisquamis de Andrade, 1994*
A. corayi Baroni Urbani, 1980*
A. diegensis Forel, 1912
A. dubius de Andrade, 1994*
A. elegans Lattke, 1987
A. emarginatus (Fabricius, 1804)
A. exstinctus de Andrade, 1994*
A. haytianus W.M. Wheeler y Mann, 1914
A. horridus Kempf, 1964
A. inca W.M. Wheeler, 1925
A. inermis Ern. André, 1899
A. intermedius de Andrade, 1994*
A. kempfi Brown, 1978
A. longispinus W.M. Wheeler, 1936
A. lucidus de Andrade, 1994*
A. micans Forel, 1908
A. neglectus Emery, 1894
A. minans Brown, 1978
A. orchidicola Brown, 1978
A. oriens Kempf, 1964
A. simoni Emery, 1890
A. striatulus Emery, 1890
A. targionii Emery, 1894
A. testaceus Forel, 1893
A. vallensis Lattke, 1987
A. vexator Kempf, 1964

Belonopelta attenuata Mayr, 1870
B. deletrix Mann, 1922

Centromyrmex alfaroi Emery, 1890
C. brachycola (Roger, 1861)
C. gigas Forel, 1911

Cryptopone guatemalensis (Forel, 1899)

Dinoponera australis Emery, 1901
D. australis bucki Borgmeier, 1937
D. australis nigricolor Borgmeier, 1937
D. gigantea (Perty, 1833)
D. longipes Emery, 1901
D. lucida Emery, 1901

D. mutica Emery, 1901
D. quadriceps Kempf, 1972

Hypoponera agilis (Borgmeier, 1934)
H. aliena (F. Smith, 1858)
H. argentina (Santschi, 1922)
H. beebei (W.M. Wheeler, 1924)
H. clavatula (Emery, 1906)
H. collegiana (Santschi, 1925)
H. collegiana paranensis (Santschi, 1925)
H. creola (Menozzi, 1931)
H. distinguenda (Emery, 1890)
H. distinguenda dispar (Santschi, 1925)
H. distinguenda histrio (Forel, 1912)
H. distinguenda inexpedita (Forel, 1911)
H. distinguenda vana (Forel, 1909)
H. ergatandria (Forel, 1893)
H. faceta (Menozzi, 1931)
H. fenestralis (Gallardo, 1918)
H. fiebrigi antoniensis (Forel, 1912)
H. fiebrigi famini (Forel, 1912)
H. fiebrigi transiens (Santschi, 1925)
H. foeda saroltae (Forel, 1912)
H. foreli (Mayr, 1887)
H. gracilicornis (Menozzi, 1931)
H. idelettae (Santschi, 1923)
H. ignigera (Menozzi, 1927)
H. inexorata (W.M. Wheeler, 1903)
H. inexorata fallax (Forel, 1909)
H. iheringi (Forel, 1908)
H. leninei (Santschi, 1925)
H. menozzii (Santschi, 1932)
H. neglecta (Santschi, 1923)
H. nitidula (Emery, 1890)
H. opaciceps (Mayr, 1887)
H. opaciceps cubana (Santschi, 1930)
H. opaciceps gaigei (Forel, 1914)
H. opaciceps pampana (Santschi, 1925)
H. opaciceps postangustata (Forel, 1908)
H. opaciceps jamaicensis (Aguayo, 1932)
H. opacior (Forel, 1893)
H. parva (Forel, 1909)
H. perplexa (Mann, 1922)
H. punctatissima (Roger, 1859)
H. reichenspergeri (Santschi, 1923)
H. schmalzi (Emery, 1896)
H. schmalzi fugitans (Forel, 1912)
H. schmalzi paulina (Forel, 1913)
H. schwebeli (Forel, 1913)
H. stoica (Santschi, 1912)
H. trigona (Mayr, 1887)
H. trigona cauta (Forel, 1912)
H. vernacula (Kempf, 1962)
H. viri (Santschi, 1923)
H. wilsoni (Santschi, 1924)

Simopelta bicolor (Borgmeier, 1950)
S. curvata Mayr, 1887
S. jeckylli Mann, 1916
S. laticeps (Gotwald y Brown, 1967)
S. manni (Wheeler, 1935)
S. minima Brandão, 1989
S. oculata (Gotwald y Brown, 1967)
S. paeminosa (Snelling, 1971)
S. pergandei Forel, 1909
S. williamsi (W.M. Wheeler, 1935)

Leptogenys amazonica Borgmeier, 1930
L. ambigua Santschi, 1931
L. anacleti Borgmeier, 1930
L. antillana W.M. Wheeler y Mann, 1914
L. arcuata Roger, 1861
L. arcuata deletangi Santschi, 1921
L. australis (Emery, 1888)
L. bohlsi Emery, 1896
L. bohlsi weiseri Santschi, 1925
L. consanguinea W.M. Wheeler, 1909
L. crudelis (F. Smith, 1858)
L. dasygyna W.M. Wheeler, 1923
L. donisthorpei Mann, 1922
L. famelica Emery, 1896
L. gagei Wheeler, 1923
L. gagei defuga W.M. Wheeler, 1923
L. gagates Mann, 1922
L. guianensis W.M. Wheeler, 1923
L. hanseni Borgmeier, 1930
L. honduriana Mann, 1922
L. iheringi Forel, 1911
L. imperatrix Mann, 1922
L. ingens Mayr, 1866
L. langi W.M. Wheeler, 1923
L. linearis (F. Smith, 1858)
L. luederwaldti Forel, 1913
L. maxillosa (F. Smith, 1858)
L. melzeri Borgmeier, 1930
L. mexicana Mayr, 1870
L. mucronata Forel, 1893
L. mucronata columbica Forel, 1901
L. peninsularis Mann, 1926
L. pubiceps Emery, 1890
L. pubiceps cubaensis Santschi, 1930
L. pubiceps vincentensis Forel, 1901
L. punctaticeps Emery, 1890
L. pusilla Emery, 1890
L. pusilla panamana W.M. Wheeler, 1923
L. quiriguana W.M. Wheeler, 1923
L. ritae Forel, 1899
L. rufa Mann, 1922
L. unistimulosa Roger, 1863
L. unistimulosa bahiana Santschi, 1928
L. unistimulosa trinidadensis Forel, 1901

L. venatrix Forel, 1899
L. vogeli Borgmeier, 1933
L. wheeleri Forel, 1901

Pachycondyla aenescens (Mayr, 1870)
P. apicalis (Latreille, 1802)
P. arhuaca Forel, 1901
P. atrovirens (Mayr, 1866)
P. bucki (Borgmeier, 1927)
P. bugabensis (Forel, 1899)
P. carbonaria (F. Smith, 1858)
P. carinulata (Roger, 1861)
P. cavinodis Mann, 1916
P. chyzeri Forel, 1907
P. commutata Roger, 1860
P. constricta (Mayr, 1883)
P. crassinoda (Latreille, 1802)
P. crenata (Roger, 1861)
P. eleonora Forel, 1921
P. emiliae Forel, 1901
P. fauveli (Emery, 1896)
P. ferruginea (F. Smith, 1858)
P. foetida (Linnaeus, 1758)
P. fuscoatra Roger, 1861
P. goeldii Forel, 1912
P. guianensis Weber, 1939
P. harpax (Fabricius, 1804)
P. holmgreni W.M. Wheeler, 1925
P. impressa Roger, 1861
P. laevigata (F. Smith, 1858)
P. lenkoi Kempf, 1962
P. lineaticeps (Mayr, 1866)
P. luteola (Roger, 1861)
P. magnifica Borgmeier, 1929
P. metanotalis Luederwaldt, 1918
P. oberthueri (Emery, 1890)
P. obscuricornis (Emery, 1890)
P. prociua Emery, 1890
P. rostrata (Emery, 1890)
P. stigma (Fabricius, 1804)
P. striata Fr. Smith, 1858
P. striatinodis (Emery, 1890)
P. theresiae (Forel, 1899)
P. unidentata (Mayr, 1862)
P. venusta Forel, 1912
P. villosa (Fabricius, 1804)

Odontomachus affinis Guérin, 1844
O. allolabis Kempf, 1974
O. bauri Emery, 1892
O. biolleyi Forel, 1908
O. biumbonatus Brown, 1976
O. bradleyi Brown, 1976
O. brunneus (Patton, 1894)
O. caelalus Brown, 1976
O. chelifér (Latreille, 1802)

O. clarus Roger, 1861
O. cornutus Stitz, 1933
O. erythrocephalus Emery, 1890
O. haematodus (Linnaeus, 1758)
O. insularis Guérin, 1844
O. hastatus (Fabricius, 1804)
O. laticeps Roger, 1861
O. mayi Mann, 1912
O. mormo Brown, 1976
O. opaciventris Forel, 1899
O. panamensis Forel, 1899
O. ruginodis M.R. Smith, 1937
O. spissus Kempf, 1962
O. scalptus Brown, 1978
O. yucatecus Brown, 1976

Thaumatomyrmecini

Thaumatomyrmex atrox Weber, 1939
T. baryai Fontenla, 1995

T. cochlearis Creighton, 1928
T. contumax Kempf, 1975
T. ferox Mann, 1922
T. mutilatus Mayr, 1887

Typhlomyrmecini

Typhlomyrmex bruchi Santschi, 1922
T. clavicornis Emery, 1906
T. foreli Santschi, 1925
T. major Santschi, 1923
T. prolatus Brown, 1965
T. pusillus Emery, 1894
T. rogenhoferi Mayr, 1862

Ponerinae *incertae sedis*

Probolomyrmex boliviensis Mann, 1923
P. brujitae Agosti, 1994
P. guanacastensis Agosti, 1997
P. petiolatus Weber, 1940

Subfamilia Pseudomyrmecinae

M. Ospina y P. S. Ward

Myrcidris epicharis Ward, 1990

Pseudomyrmex acanthobius (Emery, 1896)
P. acanthobius coccae (Santschi, 1922)
P. acanthobius fuscatus (Emery, 1896)
P. acanthobius virgo (Santschi, 1922)
P. adustus (Borgmeier, 1929)
P. alternans (Santschi, 1936)
P. alustratus Ward, 1989
P. alvarengai Kempf, 1961
P. antiguanus (Enzmann, 1944)
P. antiguanus brunnipes (Enzmann, 1944)
P. antiquus Ward, 1992*
P. apache Creighton, 1953
P. atripes (F. Smith, 1860)
P. avitus Ward, 1992*
P. baros Ward, 1992*
P. beccarii (Menozi, 1935)
P. boopis (Roger, 1863)
P. browni Kempf, 1967
P. brunneus (F. Smith, 1877)
P. caeciliae (Forel, 1913)
P. championi (Forel, 1899)
P. cladoicus (F. Smith, 1858)
P. colei (Enzmann, 1944)
P. colei vistanus (Enzmann, 1944)
P. concolor (F. Smith, 1860)
P. coruscus Ward, 1992*
P. cretus Ward, 1989

P. crudelis Ward, 1999
P. cubaensis (Forel, 1901)
P. curacaensis (Forel, 1912)
P. deminutus Ward, 1999
P. dendroicus (Forel, 1904)
P. denticollis (Emery, 1890)
P. depressus (Forel, 1906)
P. distinctus (F. Smith, 1877)
P. duckei (Forel, 1906)
P. eculeus Ward, 1999
P. eduardi (Forel, 1912)
P. ejectus (F. Smith, 1858)
P. elongatulus (Dalle Torre, 1892)
P. elongatulus longus (Forel, 1912)
P. elongatus (Mayr, 1870)
P. ethicus (Forel, 1911)
P. euryblemma (Forel, 1899)
P. excisus (Mayr, 1870)
P. faber (F. Smith, 1858)
P. ferox Ward, 1999
P. ferrugineus (F. Smith, 1877)
P. fervidus (F. Smith, 1877)
P. fiebrigi (Forel, 1908)
P. filiformis (Fabricius, 1804)
P. flavicornis (F. Smith, 1877)
P. flavidulus (F. Smith, 1858)
P. flavidulus lizeri (Santschi, 1922)
P. fortis (Forel, 1899)
P. gebellii (Forel, 1899)

- P. gibbinotus* (Forel, 1908)
P. godmani (Forel, 1899)
P. goeldii (Forel, 1912)
P. gracilis (Fabricius, 1804)
P. gracilis argentinus (Santschi, 1934)
P. gracilis atrinodus (Santschi, 1934)
P. haytianus (Forel, 1901)
P. hesperius Ward, 1993
P. holmgreni (W.M. Wheeler, 1925)
P. hospitalis Ward, 1999
P. incurrens (Forel, 1912)
P. inquilinus Ward, 1996
P. insuavis Ward, 1999
P. ita (Forel, 1906)
P. janzeni Ward, 1993
P. kuenckeli (Emery, 1890)
P. laevifrons Ward, 1989
P. laevigatus (F. Smith, 1877)
P. laevivertex (Forel, 1906)
P. lynceus (Spinola, 1851)
P. macrops Ward, 1992*
P. maculatus (F. Smith, 1855)
P. major (Forel, 1899)
P. malignus (W.M. Wheeler, 1921)
P. mandibularis (Spinola, 1851)
P. mixtecus Ward, 1993
P. monochrous (Dalle Torre, 1892)
P. mordax (Warming, 1894)
P. nexilis Ward, 1992*
P. niger (Donisthorpe, 1940)
P. nigrocinctus (Emery, 1890)
P. nigropilosus (Emery, 1890)
P. oculatus (F. Smith, 1855)
P. oki (Forel, 1906)
P. opaciceps Ward, 1993
P. oryctus Ward, 1992*
P. osurus (Forel, 1911)
P. pallens (Mayr, 1870)
P. pallens landolti (Forel, 1912)
P. pallidus (F. Smith, 1855)
P. particeps Ward, 1993
P. pazosi (Santschi, 1909)
P. peperi (Forel, 1913)
P. perboscii (Guérin, 1844)
P. peruvianus (Wheeler, 1925)
P. phyllophilus (F. Smith, 1858)
P. pictus (Stitz, 1913)
P. pisinnus Ward, 1989
P. prioris Ward, 1992*
P. pupa (Forel, 1911)
P. reconditus Ward, 1993
P. rochai (Forel, 1912)
P. rubiginosus (Stitz, 1913)
P. rufiventris (Forel, 1911)
P. rufomedius (F. Smith, 1877)
P. salvini (Forel, 1899)
P. santschii (Enzmann, 1944)
P. satanicus (W.M. Wheeler, 1942)
P. schuppi (Forel, 1901)
P. seminole Ward, 1985
P. sericeus (Mayr, 1870)
P. sericeus cordiae (Forel, 1904)
P. sericeus lisa (Enzmann, 1944)
P. sericeus longior (Forel, 1904)
P. simplex (F. Smith, 1877)
P. simulans Kempf, 1958
P. solisi (Santschi, 1916)
P. solisi belgranoi (Santschi, 1916)
P. spiculus Ward, 1989
P. spinicola (Emery, 1890)
P. squamifer (Emery, 1890)
P. subater (W.M. Wheeler y Mann, 1914)
P. subtilissimus (Emery, 1890)
P. succinus Ward, 1992*
P. tachigaliae (Forel, 1904)
P. tenuis (Fabricius, 1804)
P. tenuissimus (Emery, 1906)
P. terminalis (F. Smith, 1877)
P. termitarius (F. Smith, 1855)
P. thecolor Ward, 1992*
P. triplaridis (Forel, 1904)
P. triplarinus (Weddell, 1850)
P. ultrix Ward, 1999
P. unicolor (F. Smith, 1855)
P. urbanus (F. Smith, 1877)
P. veneficus (W.M. Wheeler, 1942)
P. venustus (F. Smith, 1858)
P. vicinus Ward, 1992*
P. viduus (F. Smith, 1858)
P. villosus Ward, 1989
P. vinneni (Forel, 1906)
P. vitabilis Ward, 1999
P. voytowskii (Enzmann, 1944)
P. voytowskii costaricensis (Enzmann, 1944)
P. weberi (Enzmann, 1944)
P. wheeleri (Enzmann, 1944)

Literatura citada

Alayo, P.D. 1974. Introducción al estudio de los himenópteros de Cuba. Superfamilia Formicoidea. *Academia de Ciencias de Cuba. Instituto de Zoología. Serie Biológica* No. 53:1-58.

Bolton, B. 1995. *A New General Catalogue of the Ants of the World*. Harvard University Press.

Brandão, C.R.F. 1991. Adendos ao catálogo abreviado das formigas da Região Neotropical. *Revista Brasileira de Entomologia* 35:319-412.



- Cuezzo, F. 1998. Capítulo 42. Formicidae, pp. 452-462 en: J.J. Morrone y S. Coscarón, eds., *Biodiversidad de Artrópodos Argentinos*. Ediciones SUR, La Plata.
- Escalante, J.A. 1993. Especies de hormigas conocidas del Perú (Hymenoptera: Formicidae). *Revista Peruana de Entomología* 34:1-13.
- Fernández, F., E.E. Palacio, W.P. y E. MacKay. 1996. Introducción al estudio de las hormigas (Hymenoptera: Formicidae) de Colombia, pp. 349-412 en G. Andrade, G. Amat y F. Fernández, eds., *Insectos de Colombia. Estudios Escogidos*. Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Colección Jorge Alvarez Lleras No. 10 y Centro Editorial Javeriano (CEJA), Bogotá D.C.
- Fowler, H.G. 1980. Nuevos registros de hormigas para el Paraguay (Hymenoptera: Formicidae). *Neotropica* 26(76):183-186.
- Johnson R.A. y P.S. Ward. 2002. Biogeography and endemism of ants (Hymenoptera: Formicidae) in Baja California, México: a first overview. *Journal of Biogeography* 29:1009-1026.
- Kempf, W.W. 1970. Catálogo das Formigas do Chile. *Papéis Avulsos de Zoologia* 23(3):17-43.
- Kempf, W.W. 1972. Catálogo abreviado das Formigas da Região Neotropical (Hymenoptera: Formicidae). *Studia Entomologica* 15(1-4):3-343.
- MacKay, W.P. *The Biology and Systematics of New World Carpenter Ants of the Genus Camponotus (Hymenoptera: Formicidae)*. En preparación.
- Maes, J.-M. y W. MacKay. 1993. Catálogo de las hormigas (Hymenoptera: Formicidae) de Nicaragua. *Revista Nicaragüense de Entomología* 23:1-46.
- Rojas-Fernández, P. 1996. Formicidae (Hymenoptera). Pp. 483-500 en: J. Llorente, A. García y E. Gonzalez (eds) *Biodiversidad, taxonomía y biogeografía de México: Hacia una síntesis de su conocimiento* UNAM, México.
- Smith, M.R. 1937. The ants of Puerto Rico. *Journal of Agriculture, The University of Puerto Rico* 20(4):819-875.
- Snelling, R.R. y J.H. Hunt. 1976. The ants of Chile. *Revista Chilena de Entomología* 9:63-129.
- Wilson, E.O. 2003. *Pheidole in the New World: A Dominant, Hyperdiverse Ant Genus* Harvard University Press, 802 pp. + CD.
- De Zolessi, L.C., Y.P. de Abenante y M.E. Philippi. 1989. *Catálogo sistemático de las especies de formicidos del Uruguay*. Publicación Extra No. 41, Museo Nacional de Historia Natural, Montevideo, 40 pp.

